

**2023 年萍乡市“振兴杯”医药卫生行业职业
技能竞赛药品购销员赛项技术工作文件**

2023 年 10 月

目 录

1. 项目简介	3
1.1 项目描述	3
1.2 考核目的	3
1.3 相关文件	3
1.4 参赛选手要求	4
2. 选手需具备的能力	4
3. 竞赛项目	5
3.1 竞赛模块	5
3.2 模块简述	5
3.2.1 模块一：理论考试	5
3.2.2 模块二：药品陈列	6
3.2.3 模块三：药品推介	7
3.3 命题方式	8
3.4 命题方案	8
3.4.1 模块 A：理论考试	8
3.4.2 模块 B：药品陈列	9
3.4.3 模块 C：药品推介	11
3.5 考核时间及地点安排	12
4. 评分标准	12
4.1 评价分（主观）	12
4.2 测量分（客观）	13
4.3 评分流程说明	13
4.4 统分方法	13
4.5 裁判构成和分组	13
4.5.1 裁判组	13
4.5.2 裁判任职条件	14
4.5.3 预期分组与分工方案	14
5. 竞赛相关设施设备	14
5.1 场地设备	14
5.1.1 理论竞赛基础设施	14
5.1.2 技能竞赛基础设施	14
5.2 材料	15
5.3 决赛选手自备的设备和工具	15
5.4 决赛场地禁止自带使用的设备和材料	15
6. 项目特别规定	15
7. 赛场布局要求	16
8. 健康安全和绿色环保	16
9. 开放赛场	16

本项目技术工作文件（技术描述）是对本竞赛项目内容的框架性描述，正式比赛内容及要求以竞赛最终公布的赛题为准。

1.项目简介

1.1 项目描述

药品购销是指在医药生产企业流通岗位和医药经营企业相关岗位进行药品陈列、药品推介等相关工作。药品购销职业技能大赛能够充分体现药品购销技术人员的专业技能水平，选手需要经过药品购销理论知识的学习，药品陈列、药品推介等实践活动，独立操作、安全完成符合相关法律法规规定的药品购销实践操作。

该项目主要参考著作是《药品购销技术》（全国医药行业职业技能竞赛教材化学工业出版社出版叶真丛淑芹主编）。

该项目所对应的工种：医药商品购销员（4-01-99-01）。

1.2考核目的

本次竞赛目的是为 2023 年全省行业职业技能竞赛选拔人才。

竞赛考核以全省医药行业特有职业技能竞赛为主要参照，参考“药品购销员赛项”的竞赛规则和评分标准，以确保考核的公平公正。本赛项主要考核医药商品采购、药品销售等理论知识、药品陈列、药品推介等核心知识与技能。

1.3相关文件

本项目技术工作文件只包含项目技术工作的相关信息。除阅读本文件外，开展本技能项目竞赛还需配合其他相关文件一同使用：

1.标准类文件

- a) 《中华人民共和国药典》（2020 年版）
- b) 《中华人民共和国药品管理法》（2019 年修订）
- c) 《药品经营质量管理规范》（总局令第 28 号）
- d) 《药品经营质量管理规范》冷藏、冷冻药品的储存与运输管理等 5 个附录（2016 年第 197 号）

- e) 《药品说明书和标签管理规定》(局令第 24 号)
- f) 《麻醉药品和精神药品管理条例》(国务院令第 442 号)
- g) 《医疗用毒性药品管理办法》(国务院令第 23 号)
- h) 《处方药与非处方药分类管理办法》(局令第 10 号)
- i) 《药品召回管理办法》(局令第 29 号)
- j) 《处方管理办法》(卫生部令第 53 号)
- k) 《药品不良反应报告和监测管理办法》(卫生部令第 81 号)
- l) 《药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告审查管理暂行办法》(总局令第 21 号)
- m) 《医药商品购销员》国家职业技能标准(劳动和社会保障部办公厅制定)

2. 著作类文件

- a) 《药品购销技术》(全国医药行业职业技能竞赛教材化学工业出版社出版叶真丛淑芹主编)

3. 试题文件

4. 设备设施清单

5. 竞赛规则

6. 健康安全与环境公告

1.4 参赛选手要求

本项目为单人赛, 选手应为 2007 年 7 月 1 日之前出生、法定退休年龄以内、萍乡行政区域内的从业人员、职业院校(技工院校)相关专业的学生。已通过竞赛获得江西省技术能手荣誉或市级职业技能竞赛第一名的人员不再以选手身份参加竞赛。

2. 选手需具备的能力

模块	知识与技能	权重
1. 药品陈列	选手应具备的知识(应知) 药店分区布局 药品陈列原则	30%

	<p>按药理作用级用途对药品进行分类选手应具备的工作能力（应会）：</p> <p>在规定时间内，按照 GSP 的规定以及药品分类存放的原则，将 50 种药品分区分类正确摆放在货架内</p>	
2. 药品推介	<p>选手应具备的知识（应知）</p> <p>常见病的药物治疗</p> <p>常用药物的作用机理、特点、作用用途、不良反应及注意事项</p> <p>选手应具备的工作能力（应会）：</p> <p>能识别常见药品的商品名、英文名，能根据常见疾病的症状推介药品，并提供药学咨询和用药指导</p>	70%

3. 竞赛项目

3.1 竞赛模块

竞赛项目分为两个模块，理论考试要求在规定时间内完成，占总分值的 30%，技能操作成绩占竞赛总成绩的 70%，包括药品陈列、药品推介共两项。

模块编号	模块名称	竞赛时间 min	分数		
			评价分	测量分	合计
A	理论考试	90	0	30	30
B	药品陈列	6	0	20	20
C	药品推介	20	2	48	50
总计		116	2	98	100

最终成绩=理论考试*30%+（药品陈列+药品推介）*70%

3.2 模块简述

3.2.1 模块一：理论考试

任务描述：采用笔试的形式进行考核，考查学生对医药商品购销相关知识的掌握情况。

考核理论要点：（1）职业道德与安全知识；（2）法律法规基础知识；（3）医学基础知识；（4）药物基础知识；（5）常用药物介绍；（6）保健食品与医疗器械；（7）常见病药物治疗；（8）药品购销知识；（9）用药咨询与指导、顾客服务。

3.2.2 模块二：药品陈列

药品陈列是指将药品按照其贮存要求、功能分类进行合理存放和展示。现场考核选手在规定时间内，按照 GSP 的规定以及药品分类存放的原则，将 50 种药品分区分类正确摆放在货架内。

药品陈列考核技术要点：（1）药品陈列的原则；（2）药品的分类。

药品陈列分类参考：

处方药区

- （1）抗感染药（抗微生物药）—抗菌药物、抗病毒药、抗真菌药；
- （2）抗寄生虫药—驱肠虫药；
- （3）解热镇痛抗炎、抗痛风药—解热镇痛抗炎药、抗痛风药；
- （4）神经系统用药—抗癫痫药、抗震颤麻痹药、脑血管病用药、中枢兴奋药；
- （5）精神障碍用药—抗焦虑药、抗抑郁药、镇静催眠药；
- （6）呼吸系统用药—镇咳药、祛痰药、平喘药；
- （7）消化系统用药—助消化药、抗酸药、抗溃疡病药、胃肠解痉药、促胃动力药、泻药、止泻药、肝胆辅助用药、炎性肠病药、微生态药物；
- （8）循环系统用药（心血管系统用药）—抗心绞痛药、抗心律失常药、抗心衰药、抗高血压药、抗休克药、调脂及抗动脉粥样硬化药；
- （9）泌尿系统用药—脱水利尿药、良性前列腺增生用药；
- （10）血液系统用药—抗贫血药、抗血小板药、抗凝血药及溶栓药；
- （11）激素及影响内分泌药—口服降糖药、肾上腺皮质激素药、甲状腺激素及抗甲状腺药、抗骨质疏松药；
- （12）抗变态反应药（抗过敏药）；

(13) 皮肤科用药—抗感染药、角质溶解药、肾上腺皮质激素类药；

(14) 五官科用药—眼科用药、耳鼻喉科用药；

(15) 儿科用药；

(16) 妇产科用药。

非处方药区

(1) 抗寄生虫药—驱肠虫药；

(2) 解热镇痛抗炎药

(3) 呼吸系统用药—镇咳药、祛痰药、平喘药；

(4) 消化系统用药—助消化药、抗酸药、抗溃疡病药、胃肠解痉药、促胃动力药、泻药、止泻药、肝胆辅助用药；

(5) 泌尿系统用药—良性前列腺增生用药；

(6) 血液系统用药—抗贫血药；

(7) 抗变态反应药（抗过敏药）；

(8) 维生素、矿物质类药—微生素、矿物质；

(9) 皮肤科用药—抗感染药、角质溶解药、肾上腺皮质激素类药；

(10) 五官科用药—眼科用药、耳鼻喉科用药；

(11) 儿科用药；

(12) 妇产科用药；

含麻含特复方制剂

拆零药品

冷藏药品

非药品

3.2.3 模块三：药品推介

考核选手的医学基础知识、药学知识、用药指导和健康指导等技能，要求在规定的时间内完成并计时。药品推介题目将模拟现实销售场景，选手根据给出患者的症状表现、自然信息等，对患者疾病进行评估并给出理由，同时推荐展示两种化学药品（一个为主药，一个为辅助用药），写出推荐药品的作用机理，并对主药做用药交代（服用时间、服用方法、不良反应、注意事项等问题）。再推荐一

种中成药，并写出其药品名称和基本作用。

考核技术要点：（1）药品推介的相关知识；（2）合理用药的指导。

3.3 命题方式

本项目为赛前需对试题保密的项目。赛前一周公布样题（包括赛题、素材、评分细则）。赛前，赛区执委会应商本赛区相关项目裁判长，参照本项目试题命制、公布的方法和程序，结合国内保密工作管理要求，命题和公布试题，确保比赛公平、公正。

3.4 命题方案

3.4.1 模块 A：理论考试

时间为 90 分钟，共计 85 题，包括单项选择题 60 题，每题 1 分；多项选择题 15 题，每题 2 分；判断题 10 题，每题 1 分，共计 100 分。成绩按 30% 计入选手总成绩。

理论考试知识点权重表

模块	主要内容	权重
1. 职业道德与安全知识	职业道德	2%
	安全知识	1%
2. 法律法规知识	《中华人民共和国药品管理法》、《药品经营质量管理规范》及附录；《处方药与非处方药分类管理办法》；《处方管理办法》；《药品不良反应报告和监测管理办法》；《麻醉药品和精神药品管理条例》；《医疗用毒性药品管理办法》；《药品说明书和标签管理规定》；《药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告审查管理暂行办法》；《药品召回管理办法》	15%
3. 医学基础知识	人体的构成；医学微生物学；常规检验指标解读	5%

4. 药物基础知识	药物的分类方法；药物的剂型及特点；药品的质量要求；药物的基本作用；药物的体内过程	9%
5. 常用药物介绍	抗感染药物；解热镇痛抗炎药；呼吸系统药物；消化系统药物；循环系统药物；内分泌及代谢系统药物；血液系统药物；变态反应药；维生素与矿物质药物；五官、皮肤及外用药	23%
6. 常见病药物治疗	感冒与流行性感冒；支气管炎与支气管哮喘；变应性鼻炎；慢性咽炎；反流性食管炎、慢性胃炎、消化不良、消化性溃疡；腹泻与便秘；高血压、高脂血症、糖尿病；高尿酸血症与痛风；甲状腺功能亢进与减退症；缺铁性贫血；骨关节炎与骨质疏松；阴道炎；痤疮、荨麻疹、手足癣、皮炎和湿疹、脂溢性皮炎；沙眼、结膜炎、干眼症；口腔溃疡、牙龈炎	28%
7. 药品储存与养护	药品储存管理；药品养护；盘点管理	4%
8. 药品陈列	药品陈列	1%
9. 药品销售	药品零售管理；售后管理	3%
10. 用药咨询与指导	用药咨询与指导；药物治疗管理	3%
11. 药品营销	市场调查；市场营销战略和营销组合策略	2%
12. 经济核算	经济核算概述与指标	1%
13. 顾客服务	医药商业礼仪；咨询服务、投诉处理	3%

3.4.2 模块 B：药品陈列

在规定时间内，按照 GSP 的规定以及药品分类存放的原则，将 50 种药品分区分类正确摆放在货架内。

做到分区分类摆放：①药品与非药品分开、内服药与外用药分开、处方药与

非处方药分开区域；②需冷藏的药品与其他药分开区域，特殊管理药品单独区域摆放，拆零药品单独区域摆放；③要求主要以作用用途进行分类、分区域摆放，不要求中药与西药分开摆放；④易混淆药品应分隔摆放；⑤在同一个区域内摆放的药品在分作用用途的基础上同时按剂型集中摆放。

做到整齐摆放：①同一药品摆放在一起(前后摆放，但不得有间隙，且近效期在前)；②同品名或同品种不同规格药品相临摆放，相临品种间的间隙不能过大(不超过二指距离，体积过小品种以价签距离为准)；③商品正面向前(可立放，也可平放)，不能倒置；④50ml以上的液体剂型应立放，不能卧放。

药品购销员技能操作（药品陈列）评分标准（20分）

项目	考核要求	分值	评分标准	扣分	得分
分区分类摆放	①药品与非药品分开、内服药与外用药分开、处方药与非处方药分开区域；②需冷藏的药品与其他药分开区域，特殊管理药品单独区域摆放，拆零药品单独区域摆放；③要求主要以作用用途进行分类、分区域摆放，不要求中药与西药分开摆放；④易混淆药品应分隔摆放；⑤在同一个区域内摆放的药品在分作用用途的基础上同时按剂型集中摆放。	10	区域混淆每个扣3分		
			分类混淆每个扣2分		
			易混淆品种未分隔每个扣2分		
			剂型未相对集中每个扣1分		
			同品名或同品种不同规格药品未相临摆放每个扣0.5分		
整齐摆放	①同一药品摆放在一起(前后摆放，但不得有间隙，且近效期在前)；②同品名或同品种不同规格药品相临摆放，相临品种间的间隙不能过大(不超过二指距离，体积过小品种以价签距离为准)；③商品正面向前(可立放，也可平放)，不能倒置；④50ml以上的液体剂型应立放，不能卧放。	10	同一药品摆未放在一起每个扣0.5分		
			同品名或同品种不同规格药品未相临摆放每个扣0.5分		
			正面未向前每个扣0.5分		
			商品倒置每个扣0.5分		
			整体摆放混乱扣0.5~2分		
	完成时间： 分钟		小计		

	说明:6分钟内将50种药品正确整齐,满分20分。未放在货架上的药品视同区域混淆。	合 计		
--	------------------------------------------	-----	--	--

说明：在6分钟内完成药品陈列

3.4.3 模块 C：药品推介

选手在规定时间内完成药品推介。选手现场随机抽取题目并作答。要求选手独立完成答题。药品推介题目将模拟现实销售场景，选手根据给出的患者症状表现和自然信息等，对患者疾病进行评估并给出理由，同时推荐展示两种化学药品（一个为主药，一个为辅助用药），写出推荐药品的作用机理，并对主药做用药交代（服用时间、服用方法、不良反应、注意事项等问题）。再推荐一种中成药，并写出其药品名称和基本作用。

药品购销员技能操作（药品推介）评分标准（50分）

项目	序号	评分要素	评分细则	配分	扣分	得分
药品推介	1	疾病评估	根据症状或检查指标，疾病判断准确	1		
		判断理由	理由描述准确	1		
	2	推荐化学药品（或医疗器械）	推荐药品每错1个扣4分	8		
	3	推荐化学药品（或医疗器械）作用或特点	作用特点每错1处扣1分	6		
		作用机理	作用机理每错1个扣4分 描述不准确每处扣1分	8		
	4	用药交待	用法用量每错1处扣4分	8		
			贮藏方法描述准确	2		
			不良反应描述准确	2		
			用药注意事项每错1处扣1分	8		
	5	推荐中成药	药品推荐准确	4		
			作用描述准确	1		
	6	考位还原	药品放回货架准确	1		
合 计				50		

3.5 考核时间及地点安排

本项目决赛考核时间为 2023 年 11 月 3-4 日，地点：萍乡卫生职业学院。

4. 评分标准

本项目评分标准分为测量和评价两类。凡可采用客观数据表述的评判称为测量；凡需要采用主观描述进行的评判称为评价。

4.1 评价分（主观）

评价分（Judgement）打分方式：3 名裁判为一组，各自单独评分，计算出平均权重分，除以 3 后再乘以该子项的分值计算出实际得分。裁判相互间分差必须小于等于 1 分，否则需要给出确切理由并在小组长或裁判长的监督下进行调分。权重表如下：

权重分值	要求描述
0 分	各方面均低于行业标准，包括“未做尝试”
1 分	达到行业标准
2 分	达到行业标准，且某些方面超过标准
3 分	达到行业期待的优秀水平

样例：药品推介：流程、操作、记录、优先等级

权重分值	要求描述
0 分	流程混乱，操作不规范
1 分	明确的流程、操作规范
2 分	明确的流程，规范准确的操作，正确的记录
3 分	明确和清晰的操作流程，规范精准高效率的操作，正确并清晰记录，优先等级的明确体现

4.2 测量分（客观）

测量分（Measurement）打分方式：按模块设置若干个评分组，每组由 3 名裁判构成。每个组所有裁判一起商议，在对该选手在该项中的实际得分达成一致后最终只给出一个分值。若裁判数量较多，也可以另定分组模式。

测量分评分准则样例表：

类型	示例	最高分值	正确分值	不正确分值
满分或零分				
从满分中扣除				
从零分开始加				

样例：药品推介

类型	示例	最高分值	正确分值	不正确分值
满分或零分	用药合理性判断	1.0	1.0	1.0
从满分中扣除	用药注意事项每错 1 处扣 1 分	8.0	8.0	0-7
从零分开始加	解决措施（每对一个加 1 分	8.0	8.0	0-7

4.3 评分流程说明

本项目采用是过程评分，无时间分，比赛时间内完成的技能点有分，未完成的不给分。

4.4 统分方法

由项目工作人员进行录分，由各模块评分小组组长监督录分过程，最后由裁判长进行复核。

4.5 裁判构成和分组

4.5.1 裁判组

裁判组设裁判员 3 名。裁判员可从项目技术专家中抽取裁判，经执委会审核

后确定。每个考场配备 3 名裁判监考。

4.5.2 裁判任职条件

由大赛执委会聘请热爱祖国，遵纪守法，爱岗敬业，思想品德优秀，有较强的团队合作精神和组织协调能力，处理问题公平、公正，年龄原则上不超过 60 岁；具有相关职业（赛项）技师职业资格或中级以上专业技术职务者优先。

4.5.3 预期分组与分工方案

根据裁判员数量预期按模块不同进行分工。按照规则评分，各项目考核评分标准见各模块的技术文件内容。

模块	分工方案
模块 一：理论考试	监考：每考场 3 人；测量分评定：3 人
模块 二：药品陈列	监考：每考场 3 人；测量分评定：3 人
模块 三：药品推介	监考：每考场 3 人；测量分评定：3 人

5.竞赛相关设施设备

5.1 场地设备

5.1.1 理论竞赛基础设施

具备设施齐全的职业技能鉴定标准化考室，每间教室能满足 60 名考生考试。

5.1.2 技能竞赛基础设施

（以每一个选手必须配备）

序号	设备名称	型号	单位	数量
1	双面药架	定制	个	8
2	药品收纳篮	定制	个	8
3	背柜	定制	套	8
4	玻璃前柜	定制	套	8
5	实训服	定制	套	若干

备注：以上设备每一个选手必须配备，所有竞赛设备都是承办方筹备，型号、单

位、数量不定，以现场参观为准。

5.2 材料

(以每一个选手必须配备)

序号	设备名称	型号	单位	数量
1	药盒	定制	个	若干
2	分类标牌	定制	个	若干

备注：以上材料每一个选手必须配备，所有竞赛材料都是承办方筹备，型号、单位、数量不定，对参赛选手保密。

5.3 决赛选手自备的设备和工具

无需自备设备和工具。

5.4 决赛场地禁止自带使用的设备和材料

禁止选手将任何设备和工具带入赛场使用。

6.项目特别规定

(1) 各参赛选手严格遵守比赛规则、比赛纪律和安全操作规程，尊重裁判员和赛场工作人员，自觉维护赛场秩序。

(2) 各参赛选手不得将手机、掌上电脑等通讯工具带入理论考试考场和实操比赛工位。

(3) 各参赛选手须持身份证、参赛证进入比赛场地，并接受裁判员的核查。

(4) 各参赛选手须爱护比赛场地的器材、工具等，不得人为损坏。比赛过程中不准相互交谈，不准偷看暗示，不准擅自离开赛场。

(5) 比赛结束时间到，由裁判员统一发出指令，参赛选手应立即停止操作，不得拖延，否则取消比赛成绩。

(6) 选手如对裁判员的执裁有异议时，须在成绩公布 2 小时内由领队、指导老师提出书面报告送交赛务组。

7.赛场布局要求

实际操作比赛赛场要求：配备有多媒体设备，依据 2016 年新修订 GSP 要求，操作场地模拟药店建设，设备设施齐全，可满足药品购销员技能竞赛场地需求。药品陈列选择一间实训室进行，可同时提供 8 名选手同时进行；药品推介选择在一间实训室进行，可同时提供 8 名选手同时进行。比赛场地于竞赛前一天至竞赛场地查看。

8.健康和绿色环保

8.1 安全设施

1.赛场周边设有卫生间、医疗等公共服务区和紧急疏散通道，并在赛场周围设置隔离带；赛前组织对赛场进行检查，赛场布置，赛场内的器材、设备，应符合国家有关安全规定。如有必要，可进行赛场仿真模拟测试。

2.赛场竞赛室有背景、裁判席等，通风、采光良好；竞赛室拥有竞赛工位所需的设备与器具；配备消防灭火器材及烫伤救护药品等应急预案与措施。

8.2 医疗设备与措施

赛场为选手提供必要的劳动保护，具有危险性的操作环节，裁判员要严防选手出现错误操作。配备急救人员和应急的药品、医疗器械，竞赛工位需符合安全规范要求，并在赛前制定好应急预案。

8.3 其他

大赛产生的药品混合物，全部由承办单位负责回收、保管，大赛结束后，由承办单位根据国家相应的管理规定统一进行处理。

9.开放赛场

9.1 赛场周围设立警戒线，防止无关人员进入发生意外事件。

9.2 赛场需设立赛场开放区和安全通道，用于大赛观摩和采访，保证大赛安全有序进行。

理论考试题库

一、单项选择题（共 350 题）

1、关于医药行业职业守则，以下说法错误的是（ ）。

- A、 遵纪守法，爱岗敬业
- B、 质量为本，信誉第一
- C、 急人所难，救死扶伤
- D、 薄利多销，善待顾客

答案：D

2、 医药职业道德要求职业者对患者一视同仁，无论男女老幼、职务高低、生人熟人都应平等、热诚相待。体现了医药职业道德的（ ）特点。

- A、 严肃性
- B、 平等性
- C、 连续性
- D、 全人类性

答案：B

3、（ ），是医药职业道德的根本宗旨。

- A、 提供安全、有效、经济的药品
- B、 救死扶伤，实行革命的人道主义
- C、 社会效益优先
- D、 全心全意为人民服务

答案：D

4、（ ），是医药职业道德规范的重要内容，也是评价职业活动的主要依据。

- A、 质量为本
- B、 遵纪守法
- C、 爱岗敬业
- D、 严肃认真

答案：A

5、医药职业道德的基本原则不包括（ ）。

- A、救死扶伤，实行革命的人道主义
- B、以患者为中心，提供安全、有效、经济的药品
- C、全心全意为人民服务
- D、社会效益优先

答案：D

6、以下哪种灭火方法会使用干粉灭火剂（ ）。

- A、冷却灭火
- B、窒息灭火
- C、隔离灭火
- D、抑制灭火

答案：D

7、（ ）适用于扑救电器设备的火灾。

- A、水
- B、二氧化碳
- C、化学泡沫
- D、消防栓

答案：B

8、沙土是经济而常用的灭火剂材料，其原理是（ ）。

- A、降低物体温度
- B、降低氧气含量
- C、隔绝空气
- D、发生化学反应生成抑制燃燃烧的物质

答案：C

9、（ ）是将燃烧物体附近的可燃物质隔离或疏散开，使燃烧停止。

- A、窒息灭火法
- B、隔离灭火法
- C、冷却灭火法

D、抑制灭火法

答案：B

10、 以下关于灭火方法错误的是（ ）

A、 家用电器着火时，立即用水扑灭

B、 扑灭森林火灾时，设置隔离带

C、 炒菜时油锅着火，立即盖上锅盖

D、 图书资料着火，用压缩二氧化碳灭火

答案：A

11、 已被注销药品注册证书、超过有效期等的药品，应当由（ ）监督销毁或者依法采取其他无害化处理等措施。

A、 卫生部门

B、 人民政府部门

C、 药品监督管理部门

D、 市场监督管理部门

答案：C

12、 将标示有效期为 2021. 03. 06 的药品改成有效期为 2022. 08. 06 的药品销售，该行为属于销售（ ）。

A、 假药

B、 劣药

C、 换包装药

D、 不合格药

答案：B

13、 生产、销售假药的，没收违法生产、销售的药品和违法所得，责令停产停业整顿，吊销药品批准证明文件，并处违法生产、销售的药品货值金额的罚款（ ）。

A、 十五倍以上三十倍以下

B、 两倍以上五倍以下

C、 五倍以上十倍以下

D、 三倍以上七倍以下

答案：A

14、违反《药品管理法》规定，药品网络交易第三方平台提供者未履行资质审核、报告、停止提供网络交易平台服务等义务的，责令改正，没收违法所得，并处（ ）。的罚款。

- A、二十万元以上二百万元以下
- B、五十万以上一百五十万以下
- C、三十万以上一百万以下
- D、五十万以上二百万以下

答案：A

15、国务院药品监督管理部门应当组织药学、医学和其他技术人员进行审评，对药品的（ ）以及申请人的质量管理、风险防控和责任赔偿等能力进行审查；符合条件的，颁发药品注册证书。

- A、安全性
- B、有效性
- C、质量可控性
- D、以上都是

答案：D

16、新发现和从境外引种的药材，经（ ）。批准后，方可销售。

- A、国务院药品监督管理部门
- B、所在地省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门
- C、口岸所在地药品监督管理部门
- D、所在地县级人民政府药品监督管理部门

答案：A

17、医疗机构审核和调配处方的人员必须是（ ）。

- A、执业药师
- B、主任药师以上技术职称的人
- C、主管药师以上技术职称的人
- D、依法经过资格认定的药学技术人员

答案：D

18、 药品上市许可持有人的（ ）、主要负责人对药品质量全面负责。

- A、 企业负责人
- B、 质量负责人
- C、 法定代表人
- D、 质量授权人

答案： C

19、 药品生产企业应当对药品进行（ ）。不符合国家药品标准的，不得出厂。

- A、 质量评估
- B、 质量验收
- C、 质量养护
- D、 质量检验

答案： D

20、 实施审批管理的中药材、中药饮片品种目录由国务院药品监督管理部门会同（ ）。制定。

- A、 国家药典委员会
- B、 国务院医药主管部门
- C、 国务院中医药典委员会
- D、 国务院中医药主管部门

答案： D

21、 药品经营企业购销药品，应当有真实、完整的（ ）。

- A、 购进记录
- B、 销售记录
- C、 验收记录
- D、 购销记录

答案： D

22、 销售超过有效期的药品，应视为销售（ ）。

- A、 新药
- B、 假药

- C、劣药
- D、合格药

答案：C

23、新修订《药品管理法》自哪天起实施（ ）。

- A、2019年10月10日
- B、2019年12月01日
- C、2019年10月01日
- D、2020年01月01日

答案：B

24、企业负责人应当具有（ ）以上专业技术职称，经过基本的药学专业
知识培训，熟悉有关药品管理的法律法规及本规范。

- A、中专
- B、初级
- C、中级
- D、大专

答案：C

25、患有以下何种疾病可以从事直接接触药品的工作（ ）。

- A、精神病
- B、肺结核
- C、高血压
- D、脓疱病

答案：C

26、药品经营企业的库存药品实行色标管理，退货区颜色为（ ）。

- A、黄色
- B、绿色
- C、红色
- D、蓝色

答案：A

27、验收药品应当按照（ ）查验同批号的检验报告书。

- A、 有效期
- B、 批准文号
- C、 采购日期
- D、 药品批号

答案：D

28、以下药品可以拼箱发货的是（ ）。

- A、 复方板蓝根颗粒、甘精胰岛素
- B、 党参、附子理中丸
- C、 人免疫球蛋白、门冬胰岛素
- D、 氧氟沙星胶囊、酮康唑软膏

答案：C

29、药品批发企业计算机系统采购记录应按（ ）备份,至少保存5年。

- A、 日
- B、 周
- C、 月
- D、 季度

答案：A

30、某药品包装中的贮存条件描述为:遮光、密封保存,该药品应储存于（ ）。

- A、 冷库
- B、 常温库
- C、 阴凉库
- D、 冷冻库

答案：B

31、应当对每次到货的药品进行逐批抽样验收,抽取的药品应当具有（ ），对于不符合验收标准的,不得入库,并报质量管理部门处理。

- A、 合格性
- B、 代表性
- C、 真实性
- D、 有效性

答案：B

32、 企业质量负责人应当具有大学本科以上学历、执业药师资格和（ ）年以上药品经营质量管理工作经历，在质量管理工作中具备正确判断和保障实施的能力。

A、 3

B、 4

C、 2

D、 5

答案：A

33、 首营品种是指（ ）。

A、 中国境内首次上市销售的药品

B、 本企业首次从药品生产企业采购的药品

C、 本企业首次从药品批发企业采购的药品

D、 本企业首次采购的药品

答案：D

34、 下列药品需要冷链运输和配送的是（ ）。

A、 红霉素滴眼液

B、 健胃消食片

C、 双歧杆菌四联活菌片

D、 维C泡腾片

答案：C

35、 应实行双人双锁，安装自动报警系统，与公安部门报警系统联网的是（ ）。

A、 含特殊成分复方制剂

B、 注射剂

C、 第一类精神药品

D、 中药饮片

答案：C

36、 药品批发企业销售药品，应当如实开具发票，做到（ ）一致。

A、 票、账、货

- B、票、货、款
- C、货、账、款
- D、票、账、货、款

答案：D

37、温湿度自动监测系统应当至少每隔 1 分钟更新一次测点温湿度数据，在药品储存过程中至少每隔（ ）分钟自动记录一次实时温湿度数据

- A、10
- B、40
- C、30
- D、15

答案：C

38、在药品经营企业，不属于直接接触药品岗位的人员的是（ ）等。

- A、开票员
- B、验收员
- C、养护员
- D、保管员

答案：A

39、非处方药的遴选、审批、发布和调整工作具体由哪个部门负责（ ）。

- A、国家卫计委
- B、国家药典委员会
- C、国家技术监督委员会
- D、国家药品监督管理局

答案：D

40、开具西药、中成药处方，每一种药品应当另起一行，每张处方不得超过（ ）种药品。

- A、3
- B、4
- C、5
- D、6

答案：C

41、处方开具当日有效。特殊情况下需延长有效期的，由开具处方的医师注明有效期限，但有效期最长不得超过()天。

- A、 2
- B、 3
- C、 4
- D、 5

答案：B

42、普通处方、急诊处方、儿科处方保存期限为()年。

- A、 1
- B、 2
- C、 3
- D、 4

答案：A

43、麻醉药品和第一类精神药品处方保存期限为()年。

- A、 1
- B、 2
- C、 3
- D、 4

答案：C

44、根据《处方管理办法》，为门诊患者开具的第一类精神药品控缓释制剂，每张处方不得超过()。

- A、 一次常用量
- B、 3日常用量
- C、 5日常用量
- D、 7日常用量

答案：D

45、根据《处方管理办法》，为门诊重度慢性疼痛患者开具的麻醉药品控缓释制剂，每张处方不得超过()。

- A、 3 日常用量
- B、 5 日常用量
- C、 7 日常用量
- D、 15 日常用量

答案：D

46、 药品严重不良反应是指因服用药品引起以下损害情形之一的反应()。

- A、 引起死亡
- B、 致癌、 致畸、 致出生缺陷
- C、 对生命有危险并能够致人体永久的或显著的伤残
- D、 对器官功能产生永久损伤

答案：B

47、 新的或严重的药品不良反应，应进行调查、核实，并于()报至市药品不良反应监测中心。

- A、 及时报告
- B、 发现之日起 10 日内
- C、 15 个工作日内
- D、 30 个工作日内

答案：C

48、 进口药品自首次获准进口之日起()。年内，报告该进口药品的所有不良反应。

- A、 2
- B、 3
- C、 4
- D、 5

答案：D

49、 怀疑而未确定的不良反应是()。

- A、 药品不良反应
- B、 新的不良反应
- C、 可疑不良反应

D、一般的药品不良反应

答案：C

50、药品生产企业应当对获知的死亡病例进行调查，详细了解死亡病例的基本信息、药品使用情况、不良反应发生及诊治情况等，并在()日内完成调查报告，报药品生产企业所在地的省级药品不良反应监测机构。

A、 30

B、 15

C、 7

D、 5

答案：B

51、《麻醉药品、第一类精神药品购用印鉴卡》有效期为()。

A、 一年

B、 两年

C、 三年

D、 半年

答案：C

52、根据《麻醉药品和精神药品管理条例》规定,以下哪级医师可在其医疗机构开具麻醉药品、第一类精神药品处方()。

A、主治医师

B、住院医师

C、执业医师

D、经考核合格并被授权的执业医师

答案：D

53、根据《药品说明书和标签管理规定》某批次的药品有效期为2年，生产日期是2019年06月11日，其标签有效期可标注为有效期至()。

A、 2021年06月

B、 2021年06月10日

C、 2021年06月11日

D、 2021年05月31日

答案：B

54、 下列为正确的药品标签上有效期的具体表述形式的是()。

- A、 有效期至××××年
- B、 有效期至××××年××月
- C、 有效期自生产之日起××××年
- D、 有效期至××日××月

答案：B

55、 下列药品何种不得发布广告()。

- A、 处方药
- B、 外用药品
- C、 医疗机构配制的制剂
- D、 非处方药

答案：C

56、 产品注册证明文件、备案凭证或者生产许可文件未规定有效期的，广告批准文号有效期为()。

- A、 一年
- B、 两年
- C、 三年
- D、 五年

答案：B

57、 ()应当对药品、医疗器械、保健食品和特殊医学用途配方食品广告内容的真实性和合法性负责。

- A、 生产企业
- B、 经营企业
- C、 广告审查单位
- D、 广告主

答案：D

58、 非处方药广告除显著标明非处方药标识(OTC)外，还应当显著标明()。

- A、 药品生产企业

- B、 适用人群
- C、 请按药品说明书或者在药师指导下购买和使用
- D、 本广告仅供医学药学专业人士阅读

答案：C

59、 在主动召回中，药品生产企业在作出药品召回决定后，应当制订召回计划并组织实施，并按规定的时间内，通知到有关药品经营企业、使用单位停止销售，同时向所在地省级 SFDA 报告，一级召回的时间要求是（ ）。

- A、 12 小时内
- B、 24 小时内
- C、 48 小时内
- D、 72 小时内

答案：B

60、 《药品召回管理办法》中，根据药品安全隐患的严重程度，药品的一级召回是指（ ）。

- A. 使用该药品一般不会引起健康危害，但由于其他原因需要收回的
- B. 使用该药品可能引起严重健康危害的
- C. 使用该药品可能引起暂时的或者可逆的健康危害的
- D. 使用该药品，在超剂量使用时，发现有严重健康危害的

答案：B

61、药品生产企业在启动召回后，应当在规定的时间内，将药品调查评估报告和召回计划提交所在地省级 SFDA 备案，三级召回的时间要求是（ ）。

- A、 1 日内
- B、 3 日内
- C、 7 日内
- D、 10 日内

答案：C

62、 药品生产企业在实施召回过程中，应按规定时间向所在地省级 SFDA 报告药品召回进展情况，其中，一级召回规定时间是（ ）。

- A、 每日

- B、每 3 日
- C、每 7 日
- D、每 10 日

答案：A

63、在封闭的心血管系统中，形成动脉血压的前提是（ ）。

- A、心室射血
- B、外周阻力
- C、大动脉弹性
- D、有足够的充盈血量

答案：D

64、上呼吸道是指（ ）。

- A、喉至支气管
- B、鼻至主支气管
- C、鼻至支气管
- D、鼻、咽和喉

答案：D

65、胃的排空速度，正确的是（ ）。

- A、糖最快，蛋白质次之，脂肪最慢
- B、蛋白质最快，糖次之，脂肪最慢
- C、糖最快，脂肪次之，蛋白质最慢
- D、脂肪最快，蛋白质次之，糖最慢

答案：A

66、胃酸的生理作用不包括（ ）。

- A、激活胃蛋白酶原
- B、提供酸性环境
- C、保护维生素 B₁₂，并促进其吸收
- D、杀死随食物进入胃的细菌

答案：C

67、正常成人每昼夜排出的尿量为（ ）。

- A、500-100ml
- B、2000-2500ml
- C、1500-3000ml
- D、1000-2000ml

答案：D

68、常见的人体寄生虫不包括（ ）。

- A、线虫
- B、吸虫
- C、原虫
- D、节肢动物

答案：D

69、霉菌属于（ ）。

- A、细菌
- B、真菌
- C、寄生虫
- D、病毒丝虫

答案：B

70. 白色念珠菌属于（ ）。

- A、细菌
- B、病毒
- C、真菌
- D、放线菌

答案：C

71、以下哪种现象不会引起 RBC 增多（ ）。

- A、血液浓缩
- B、连续性呕吐
- C、再生障碍性贫血
- D、慢性肺心病

答案：C

72、以下哪种现象不会引起白细胞减少（ ）。

- A、流行性感
- B、伤寒
- C、应用部分抗生素
- D、细菌感染

答案：C

73、正常人的血小板计数的参考范围是（ ）。

- A、 $(4.0-5.5) \times 10^{12}/L$
- B、 $(15.0-20.0) \times 10^9/L$
- C、 $(100-300) \times 10^{12}/L$
- D、 $(100-300) \times 10^9/L$

答案：D

74、通过测定（ ）可以反映肝细胞损伤程度

- A、AST
- B、GPT
- C、CK
- D、GLU

答案：A

75、严重烧伤会导致（ ）。

- A、红细胞减少
- B、血红蛋白量增多
- C、血小板增多
- D、红细胞沉降量增快

答案：B

76、药品批准文号编号前注S者为（ ）。

- A、辅料
- B、化学药
- C、生物药
- D、中药

答案：C

77、下列哪种剂型属于口服剂型（ ）。

- A、片剂
- B、栓剂
- C、软膏剂
- D、搽剂

答案：A

78、下列哪项不属于影响药物作用中的患者生理因素（ ）。

- A、性别
- B、年龄
- C、身高
- D、心理与精神状态

答案：D

79、（ ）是指用药记录过大或用药事件过长引起的反应，一般在超过极量时才发生。

- A、副作用
- B、变态反应
- C、毒性反应
- D、耐药性

答案：C

80、下列哪种剂型起效最快（ ）。

- A、注射剂
- B、胶囊剂
- C、缓释制剂
- D、植入剂

答案：A

81、药品包装必须按照规定（ ）。

- A、印有或贴有标签并附有说明书
- B、列明药品的获奖证书

- C、 列明包装专利知识
- D、 公布企业荣誉证书

答案： A

82、 首过效应较多的药物不宜（ ）。

- A、 直肠给药
- B、 口服给药
- C、 注射给药
- D、 舌下给药

答案： B

83、 关于液体药剂优点的叙述错误的是（ ）。

- A、 药物分散度大、吸收快
- B、 刺激性药物宜制成液体药剂
- C、 给药途径广泛
- D、 化学稳定性较好

答案： D

84、 不属于液体药剂质量要求的是（ ）。

- A、 溶液型液体药剂应澄明
- B、 乳剂或混悬剂应保证其分散相小而均匀
- C、 药物稳定、无刺激性、 剂量准确
- D、 应不得检出微生物

答案： D

85、 既可口服又供外用的剂型是（ ）。

- A、 散剂
- B、 颗粒剂
- C、 合剂
- D、 乳膏剂

答案： A

86、 按规定的适应证和用法、用量使用药品后,人体产生毒副反应的程度。体现的是药品（ ）质量特性。

- A、 稳定性
- B、 安全性
- C、 有效性
- D、 均一性

答案： B

87、 药品在规定的条件下,能够保持其有效性和安全性的能力。体现的是药品()质量特性。

- A、 稳定性
- B、 安全性
- C、 有效性
- D、 均一性

答案： A

88、 有关《中国药典》叙述错误的是()。

- A、 药典是一个国家记载药品规格、 标准的法典
- B、 药典由国家组织的药典委员会编写,并由政府颁布实施
- C、 药典不具有法律约束力
- D、 每部均含有凡例、正文和索引组成

答案： C

89、 现行版《中国药典》为 2020 年版,实施日期为()。

- A、 2020 年 1 月 1 日
- B、 2020 年 6 月 1 日
- C、 2020 年 10 月 1 日
- D、 2020 年 12 月 30 日

答案： D

90、 药品的最基本特性是()。

- A、 有效性与安全性
- B、 有效性与稳定性
- C、 稳定性与安全性
- D、 安全性与可控性

答案：A

91、 胶囊剂的缩写词是（ ）。

- A、 Tab
- B、 Sol
- C、 Caps
- D、 Amp

答案：C

92、 下面关于副作用的说法错误的是（ ）。

- A、 一般都较严重，是不可逆性的功能变化
- B、 随着治疗目的不同，副作用有时也可成为治疗作用
- C、 因是用治疗量的药物时出现的副作用，是难以避免的，故可事先向患者说明，以免误认为病情加重
- D、 有些药物的副作用可以设法纠正

答案：A

93、 在药品说明书中，其含义是列出药物的主要药理作用及可能的毒性反应，指的是（ ）。

- A、 不良反应
- B、 药理毒理
- C、 药物的相互作用
- D、 适应症

答案：B

94、 半衰期是指药物在血液中的浓度下降（ ）。所需的时间

- A、 10%
- B、 30%
- C、 50%
- D、 90%

答案：C

95、 小肠是吸收的主要部位，下列说法错误的是（ ）。

- A、 小肠吸收面积大，血流量大

- B、 小肠蠕动缓慢，pH 偏碱性
- C、 弱酸性的药物容易被小肠吸收
- D、 季铵盐类药物难吸收

答案：B

96、生理情况下细胞外液 pH 约为（ ）。

- A、 6、5
- B、 7、0
- C、 7、4
- D、 8、0

答案：C

97、 刚能引起有效作用的最小剂量, 对应最小有效浓度为()。

- A、 最小有效剂量
- B、 常用量
- C、 最小中毒量
- D、 最小致死量

答案：A

98、 药典中规定的治疗剂量的极限, 超过该量就有中毒的危险。此剂量为()。

- A、 最小有效剂量
- B、 极量
- C、 最小中毒量
- D、 最小致死量

答案：B

99、 刚能引起中毒的剂量, 对应最小中毒浓度为()。

- A、 最小有效剂量
- B、 常用量
- C、 最小中毒量
- D、 最小致死量

答案：C

100、 药物代谢的重要器官是（ ）。

- A、 汗腺
- B、 肝脏
- C、 皮肤
- D、 肾脏

答案： B

101、 仅供皮肤使用的液体剂型是（ ）。

- A、 混悬剂
- B、 糖浆剂
- C、 溶液剂
- D、 洗剂

答案： D

102、 下述途径给药不涉及吸收过程的是（ ）。

- A、 阴道给药
- B、 静脉注射
- C、 直肠给药
- D、 舌下给药

答案： B

103、 弱酸性药物在碱性尿液中（ ）。

- A、 解离度 \uparrow ， 重吸收量 \downarrow ， 排泄量 \downarrow
- B、 解离度 \uparrow ， 重吸收量 \downarrow ， 排泄量 \uparrow
- C、 解离度 \downarrow ， 重吸收量 \downarrow ， 排泄量 \downarrow
- D、 解离度 \uparrow ， 重吸收量 \uparrow ， 排泄量 \uparrow

答案： B

104、 口服剂型在胃肠道中吸收快慢的顺序一般认为是（ ）。

- A、 胶囊剂>混悬剂>溶液剂>片剂>包衣片
- B、 混悬剂>溶液剂>胶囊剂>片剂>包衣片
- C、 溶液剂>混悬剂>胶囊剂>片剂>包衣片
- D、 片剂>包衣片>胶囊剂>混悬剂>溶液剂

答案： C

105、 常见的肝药酶诱导剂不包括（ ）。

- A、 苯巴比妥
- B、 利福平
- C、 乙酰水杨酸
- D、 苯妥英钠

答案： C

106、四环素类天然品有四环素和（ ）。

- A、 土霉素
- B、 多西环素
- C、 米诺环素
- D、 克拉霉素

答案： A

107、头孢呋辛属于（ ）。

- A、 第一代头孢菌素
- B、 第二代头孢菌素
- C、 第三代头孢菌素
- D、 第四代头孢菌素

答案： B

108、克拉霉素属于（ ）。

- A、 四环素类
- B、 氨基糖苷类
- C、 大环内酯类
- D、 氯霉素类

答案： C

109、第一个人工合成的抗生素是（ ）。

- A、 青霉素
- B、 红霉素
- C、 四环素

D、 氯霉素

答案： D

110、能使异烟肼疗效降低的是（ ）。

A、 乙醇

B、 对氨基水杨酸钠

C、 利福平

D、 链霉素

答案： A

111、主要用于厌氧菌引起的系统或局部感染的药物是（ ）。

A、 利福平

B、 阿昔洛韦

C、 利巴韦林

D、 甲硝唑

答案： D

112、（ ）是各类结核病的首选药。

A、 异烟肼

B、 利福平

C、 利福喷丁

D、 盐酸乙胺丁醇

答案： A

113、能透过血脑屏障，治疗中枢真菌感染的是（ ）。

A、 克霉唑

B、 咪康唑

C、 两性霉素 B

D、 氟康唑

答案： D

114、使环丙沙星中枢毒性增加的是（ ）。

A、 茶碱

B、 铁盐

- C、口服抗酸剂
- D、非甾体抗炎药

答案： D

115、四环素类药物的抗菌机制是（ ）。

- A、与细菌细胞膜上的青霉素结合蛋白结合，抑制转肽酶活性
- B、作用于敏感菌核糖体 50S 亚基而抑制蛋白质的合成
- C、作用于细菌核糖体 30S 亚基，阻制蛋白质的合成
- D、作用于细菌细胞壁，干扰甘氨酸五肽的连接，抑制黏肽合成

答案： A

116、头孢菌素类抗生素中，抗革兰阳性菌活性最强的是（ ）。

- A、第一代头孢菌素
- B、第二代头孢菌素
- C、第三代头孢菌素
- D、第四代头孢菌素

答案： A

117、解热镇痛抗炎药物的镇痛作用对（ ）几乎无效。

- A、牙痛
- B、关节痛
- C、神经痛
- D、肠绞痛

答案： D

118、阿司匹林药理作用不包括（ ）。

- A、抗痛风
- B、镇痛
- C、抗血小板聚集
- D、抗炎抗风湿

答案： A

119、无抗炎抗风湿作用的药物是（ ）。

- A、对乙酰氨基酚

- B、吲哚美辛
- C、布洛芬
- D、舒林酸

答案：A

120、下列何药属于选择性 COX2 抑制药（ ）。

- A、布洛芬
- B、非普拉宗
- C、塞来昔布
- D、二氟尼柳

答案：C

121、具有成瘾性的镇咳药是（ ）。

- A、可待因
- B、右美沙芬
- C、喷托维林
- D、苯丙哌嗪

答案：A

122、能溶解黏痰的药物是（ ）。

- A、氯化铵
- B、乙酰半胱氨酸
- C、右美沙芬
- D、倍氯米松

答案：B

123、色甘酸钠预防哮喘发作的主要机制是（ ）。

- A、直接松弛支气管平滑肌
- B、稳定肥大细胞膜，抑制过敏介质释放
- C、阻断腺苷受体
- D、激动 α_2 受体

答案：B

124、可选择性激动支气管 β_2 受体发挥平喘作用的是（ ）。

- A、 氨茶碱
- B、 倍氯米松
- C、 色甘酸钠
- D、 硫酸沙丁胺醇

答案： D

125、奥美拉唑抗消化性溃疡的机制是（ ）。

- A、 阻断 H₂ 受体
- B、 阻断 M 受体
- C、 阻断胃泌素受体
- D、 抑制胃壁细胞 H⁺, K⁺-ATP 酶

答案： D

126、西咪替丁的药理作用机制是（ ）。

- A、 激动 H₁ 受体
- B、 阻断 H₁ 受体
- C、 激动 H₂ 受体
- D、 阻断 H₂ 受体

答案： D

127、能迅速中和胃中过剩的胃液，降低胃酸度和胃蛋白酶活性的药物是（ ）。

- A、 雷尼替丁
- B、 碳酸氢钠
- C、 普鲁卡因
- D、 兰索拉唑

答案： B

128、长期服用奥美拉唑可引起（ ）。

- A、 动脉粥样硬化
- B、 应激性大出血
- C、 血小板减少症
- D、 高胃泌素血症

答案:D

129、有消化道黏膜保护作用的抗消化性溃疡药是 ()。

- A、前列环素
- B、米索前列醇
- C、奥美拉唑
- D、氢氧化镁

答案: B

130、阿托品用于治疗内脏绞痛的作用机制为 ()。

- A、升高眼内压
- B、抑制腺体分泌
- C、阻断 M 受体, 松弛胃肠平滑肌
- D、扩张血管

答案: C

131、用于促进胃排空、减少反流, 治疗反流性食管炎的药物是 ()。

- A、胰酶
- B、雷尼替丁
- C、洛哌丁胺
- D、西沙比利

答案: D

132、口服后不被吸收, 软化粪便导泻 ()。

- A、酚酞
- B、硫酸镁
- C、液体石蜡
- D、甘油栓剂

答案: C

133、比沙可啶用于便秘的作用机制是 ()。

- A、提高肠腔的渗透压, 产生容积性排便效应
- B、与肠粘膜接触, 刺激肠壁的感觉神经末梢, 引起反射性蠕动增强, 促进粪便的排除

C、 润滑肠壁，软化大便

D、 口服不吸收，使肠腔内容积的渗透压升高，组织对肠腔内水分的吸收

答案： B

134、下列哪个药有止泻作用（ ）。

A、 硫酸镁

B、 乳果糖

C、 酚酞

D、 地芬诺酯

答案： D

135、肝胆辅助用药，通过加强肝脏代谢，提升肝脏功能的药物不包括（ ）。

A、 硝普钠

B、 联苯双酯

C、 门冬氨酸钾镁

D、 葡酯内酯

答案： A

136、强心苷抗慢性心功能不全的主要作用是（ ）。

A、 正性肌力作用

B、 增加自律性

C、 负性频率作用

D、 缩短心房不应期

答案： A

137、延长动作电位时程的药物是（ ）。

A、 利多卡因

B、 普鲁卡因胺

C、 普萘洛尔

D、 胺碘酮

正确答案： D

138、属于 I B 类抗心律失常药的是（ ）。

- A、奎尼丁
- B、利多卡因
- C、普萘洛尔
- D、胺碘酮

答案：B

139、阵发性室性心动过速，宜选用的抗心律失常药物是（ ）。

- A、维拉帕米
- B、异丙吡胺
- C、苯妥英钠
- D、普萘洛尔

答案：A

140、 β 肾上腺素受体阻断药属于（ ）。

- A、I A 类抗心律失常药
- B、I B 类抗心律失常药
- C、I C 类抗心律失常药
- D、II 类抗心律失常药

答案：D

141、抗心绞痛药的作用主要是通过（ ）。

- A、减轻心肌负荷，增加心肌缺血区血流
- B、增加心肌耗氧
- C、减少心室容积
- D、加强心肌收缩力，改善冠脉血流

答案：A

142、易引起耐受性的抗心绞痛药是（ ）。

- A、硝苯地平
- B、维拉帕米
- C、普萘洛尔
- D、硝酸甘油

答案：D

143、预防心绞痛发作常选用（ ）。

- A、硝酸甘油
- B、硝酸异山梨酯
- C、美托洛尔
- D、硝苯地平

答案：B

144、下列硝酸甘油的不良反应中，描述不正确的是（ ）。

- A、面颈皮肤潮红
- B、直立性低血压
- C、心率加快
- D、水肿

答案：D

145、可用于各种原因所致的低血压和心源性休克是（ ）。

- A、肾上腺素
- B、去甲肾上腺素
- C、多巴胺
- D、间羟胺

答案：D

146、通过直接阻断 α_1 受体而降压的药物是（ ）。

- A、利血平
- B、甲基多巴
- C、哌唑嗪
- D、硝苯地平

答案：C

147、降压药中常用钙通道拮抗剂有（ ）。

- A、利血平
- B、硝酸甘油
- C、硝苯地平
- D、普萘洛尔

答案： C

148、酒石酸美托洛尔属于（ ）。

- A、 钠通道阻滞剂
- B、 β 肾上腺素受体阻滞剂
- C、 延长动作电位时程药
- D、 选择性钙通道阻滞剂

答案： B

149、血管紧张素 I 转化酶抑制剂是（ ）。

- A、 硝普钠
- B、 卡托普利
- C、 肼苯哒嗪
- D、 哌唑嗪

答案： B

150、属于血管紧张素 II 受体阻断药的是（ ）。

- A、 普萘洛尔
- B、 硝苯地平
- C、 卡托普利
- D、 氯沙坦钾

答案： D

151、可乐定的降压机理（ ）。

- A、 激动中枢的 α_2 受体
- B、 激动中枢 M 受体
- C、 阻断中枢的 α_2 受体
- D、 激动中枢的 I_1 咪唑啉受体

答案： D

152. 高 TG 血症首选（ ）。

- A、 贝丁酸类
- B、 他汀类+贝特类
- C、 他汀类

D、普罗布考

答案：A

153、阻滞胆汁酸在肠道的重吸收（ ）。

A、吉非罗齐

B、非诺贝特

C、考来烯胺

D、洛伐他汀

答案：C

154、下列药物中，作用机制为抑制 HMG-CoA 还原酶的药物是（ ）。

A、考来烯胺

B、非诺贝特

C、依折麦布

D、洛伐他汀

答案：D

155、辛伐他汀属于（ ）。

A、烟酸类降血脂药

B、苯氧乙酸类降血脂药

C、抗氧化降血脂药

D、羟甲戊二酰辅酶 A 还原酶抑制药类降血脂药

答案：D

156、属于胰岛素增敏药的是（ ）。

A、格列本脲

B、二甲双胍

C、罗格列酮

D、阿卡波糖

答案：C

157、具有降糖作用的是（ ）。

A、阿卡波糖

B、胺碘酮

- C、利血平
- D、洛伐他汀

答案：A

158、属双胍类口服降糖药的是（ ）。

- A、格列齐特
- B、氯磺丙脲
- C、格列本脲
- D、二甲双胍

答案：D

159、降血糖作用机制为抑制 α -葡萄糖苷酶的药物是（ ）。

- A、吡格列酮
- B、格列本脲
- C、二甲双胍
- D、那格列奈

答案：B

160、可适用于尿崩症的降糖药是（ ）。

- A、吡格列酮
- B、氢氯噻嗪
- C、氯磺丙脲
- D、格列喹酮

答案：C

161、磺酰脲类降糖药的作用机制是（ ）。

- A、加速胰岛素合成
- B、抑制胰岛素降解
- C、提高胰岛 β 细胞功能
- D、刺激胰岛 β 细胞释放胰岛素

答案：D

162、下述药物中可促进尿酸排泄的包括（ ）。

- A、丙磺舒

- B、别嘌醇
- C、秋水仙碱
- D、吲哚美辛

答案：A

163、在痛风发作的急性期，应当选择的抗痛风药是（ ）。

- A. 秋水仙碱
- B. 丙磺舒
- C. 苯溴马隆
- D. 别嘌呤

答案：A

164、抗甲状腺药甲巯咪唑的作用机制是（ ）。

- A. 使促甲状腺激素释放减少
- B. 抑制甲状腺释放
- C. 直接拮抗已合成的甲状腺素
- D. 抑制甲状腺细胞内过氧化物酶

答案：B

165、小剂量碘主要用于（ ）。

- A、呆小病
- B、黏液性水肿
- C、单纯性甲状腺肿
- D、抑制甲状腺素的释放

答案：C

166、长期应用糖皮质激素，突然停药，会引起（ ）。

- A、胃溃疡
- B、肾上腺皮质功能不全
- C、皮质功能亢进
- D、满月脸、水牛背

答案：B

167、通过刺激骨形成而抗骨质疏松的药物是（ ）。

- A、依普黄酮
- B、氟制剂
- C、降钙素
- D、二膦酸盐

答案： B

168、硫酸亚铁的适应症是（ ）。

- A、 恶性贫血
- B、 产后大出血
- C、 缺铁性贫血
- D、 巨幼细胞贫血

答案： C

169、下列药物中通过促进纤维蛋白溶解的药物是（ ）。

- A、 噻氯匹定
- B、 链激酶
- C、 尿嘧啶
- D、 氨甲苯酸

答案： B

170、属于抗血小板药的是（ ）。

- A、 肝素
- B、 华法林
- C、 双嘧达莫
- D、 尿激酶

答案： C

171、肝素抗凝作用的主要机制是（ ）。

- A、 直接灭活凝血因子
- B、 激活血浆中的 ATIII
- C、 抑制肝脏合成凝血因子
- D、 激活纤溶酶原

答案： B

172、维生素 K 参与下列哪些凝血因子的合成 ()。

- A、XII、V、II、VII 因子
- B、II、VIII、XI、IV 因子
- C、VII、XI、VII、IX 因子
- D、II、VII、IX、X 因子

答案：D

173、在临床上用于防止血小板聚集的是 ()。

- A、对乙酰氨基酚
- B、阿司匹林
- C、吲哚美辛
- D、双氯芬酸

答案：B

174、体内、外均有抗凝血作用的药物是 ()。

- A. 维生素 B12
- B. 肝素
- C. 香豆素类
- D. 维生素 K

答案：B

175、下列为组织胺 H₁ 受体阻断药的是 ()。

- A、雷尼替丁
- B、马来酸氯苯那敏
- C、色甘酸钠
- D、酮替芬

答案：B

176、下列抗过敏药中，能稳定肥大细胞膜，阻止组胺等过敏介质释放的是()。

- A、氯苯那敏
- B、孟鲁司特
- C、色甘酸钠
- D、西替利嗪

答案： C

177、不属于二代抗组胺药的是（ ）。

- A、非索非那定
- B、多塞平
- C、氯雷他定
- D、西替利嗪

正确答案： B

178、氯雷他定属于

- A、抗生素
- B、抗肿瘤药
- C、抗过敏药
- D、镇静催眠药

答案： C

179、治疗结膜炎、口角炎、舌炎、阴囊炎、脂溢性皮炎等的药物是（ ）。

- A、 维生素 E
- B、 维生素 C
- C、 维生素 B₁
- D、 维生素 B₂

答案： D

180、维生素 C 可用于治疗下列哪种疾病（ ）。

- A、夜盲症
- B、脚气病
- C、坏血病
- D、佝偻病

答案： C

181、可用于巨幼细胞性贫血的维生素是（ ）。

- A、维生素 A
- B、维生素 B₁₂
- C、维生素 D

D、维生素 E

答案： B

182、维生素 B2 不宜与哪个药物合用（ ）。

A、甲氧氯普胺

B、利福定

C、利福平

D、异烟肼

答案： A

183、不属于维生素矿物质药物的是（ ）。

A、氯化钙

B、葡萄糖酸锑钠

C、葡萄糖酸钙

D、硫酸锌

答案： B

184、下列哪种维生素是水溶性维生素（ ）。

A、维生素 B

B、维生素 A

C、维生素 E

D、维生素 D

答案： B

185、下列药物中，可用于治疗青光眼的是（ ）。

A、对氨基水杨酸钠

B、盐酸苯海拉明

C、盐酸左旋咪唑

D、盐酸卡替洛尔

答案： D

186、用于治疗痤疮（ ）。

A、酮康唑

B、西替利嗪

C、阿达帕林凝胶

D、利福平

答案： C

187、感冒是由（ ）引起的上呼吸道感染性疾病。

A、 新冠病毒

B、 流感病毒

C、 呼吸道病毒

D、 埃博拉病毒

答案： C

188、为缓解感冒患者打喷嚏、流涕等卡他症状，可选用含有以下哪种有效成份的感冒药（ ）。

A、 阿司匹林

B、 氯苯那敏

C、 盐酸伪麻黄碱

D、 金刚烷胺

答案： C

189、流行性感大流行一般由（ ）引起、

A、 甲型病毒及其亚型

B、 乙型病毒

C、 丙型病毒

D、 乙型及丙型

答案： A

190、关于流感治疗不正确的是（ ）。

A、 卧床休息，多饮水

B、 高热、头痛、全身酸痛者给予对乙酰氨基酚

C、 咳嗽较剧者给予镇咳药

D、 一般用抗生素治疗或预防

答案： D

191、感冒伴有发热、头痛、关节痛、肌肉痛、或全身酸痛的可选用（ ）。

- A、阿司匹林
- B、羟甲唑啉
- C、右美沙芬
- D、复方盐酸伪麻黄碱缓释胶囊

答案：A

192、驾驶员、精密仪器操作者、高空作业人员禁止服用含有下列哪一种成分的感冒药（ ）。

- A、对乙酰氨基酚
- B、伪麻黄碱
- C、氯苯那敏
- D、氯雷他定

答案：C

193、初感冒，出现卡他症状，如鼻黏膜充血、打喷嚏、流鼻涕、流眼泪，宜服用（ ）。

- A、含伪麻黄碱和氯苯那敏制剂
- B、含氢溴酸右美沙芬制剂
- C、含中枢兴奋药咖啡因制剂
- D、含非甾体类抗炎药制剂
- E、含钙离子通道阻滞剂制剂

答案：A

194、下列哪项不属于治疗慢性支气管炎的祛痰镇咳药物（ ）。

- A、复方甘草合剂
- B、复方氯化铵合剂
- C、溴己新
- D、氨茶碱

答案：D

195、适用于黏痰阻塞引起呼吸困难的祛痰药是（ ）。

- A、色甘酸钠
- B、可待因

- C、麻黄碱
- D、乙酰半胱氨酸

答案：D

196、对慢性支气管炎产生平喘作用的药是（ ）。

- A、 溴己新
- B、 沙丁胺醇
- C、 咳必清
- D、 罗红霉素

答案： B

197、急性气管-支气管炎病人的临床表现为（ ）。

- A. 咳嗽、咳痰、气喘、胸痛
- B. 鼻塞流涕
- C. 高热呈稽留热
- D. 全身酸痛

答案： A

198、氨茶碱的平喘机制是（ ）。

- A、 激活腺苷酸环化酶
- B、 抑制腺苷酸环化酶
- C、 激活磷酸二酯酶
- D、 抑制磷酸二酯酶

答案： D

199、治疗哮喘的糖皮质激素吸入剂不包括（ ）。

- A、 倍氯米松
- B、 布地奈德
- C、 克伦特罗
- D、 曲安奈德

答案： C

200、下列哪项为治疗哮喘急性发作的首选药物（ ）。

- A、 沙丁胺醇、特步他林

- B、琥珀酸氢化可的松、甲泼尼龙
- C、泼尼松和泼尼松龙
- D、倍氯米松、布地奈德

答案：A

201、患者,男,21岁,因过敏性鼻炎就诊。关于过敏性鼻炎药物治疗及用药教育的说法,错误的是()。

- A、过敏性鼻炎患者应尽量避免接触已知的过敏原
- B、治疗过敏性鼻炎使用口服糖皮质激素,首选地塞米松
- C、过敏性鼻炎的典型症状和感冒症状相似,应注意鉴别
- D、治疗过敏性鼻炎可局部使用糖皮质激素鼻喷剂

答案：B

202、过敏性鼻炎患者应用色苷酸钠的作用是()。

- A、与组胺竞争效应细胞膜上的组胺受体发挥抗HI受体作用
- B、稳定肥大细胞膜,阻断肥大细胞脱颗粒和释放介质
- C、抗胆碱药,抑制胆碱能神经的活性
- D、收缩血管

答案：B

203、变应性鼻炎发作时,变应原刺激机体产生的抗体主要是()。

- A、IgM
- B、IgG
- C、IgD
- D、IgE

答案：D

204、季节性过敏性鼻炎常见的变应原是()。

- A、螨
- B、真菌
- C、风媒花粉
- D、羽毛

答案：C

205、下列哪个不是慢性咽炎的临床表现（ ）。

- A、咽喉部不适、干燥、发痒、疼痛或有异物感
- B、清晨起床后常会吐出微量的稀痰,伴有声音嘶哑
- C、常伴有发热
- D、有刺激性咳嗽

答案：C

206、不属于慢性咽炎患者常用药品（ ）。

- A、度米芬
- B、西地碘含片
- C、碘甘油
- D、布洛芬

答案：D

207、关于慢性咽炎说法错误的是（ ）。

- A、含服后 30 分钟内不宜进食或水
- B、避免长期过度用声
- C、避免急性咽炎反复发作
- D、症状严重时不可使用肾上腺糖皮质激素

答案：D

208、下列哪项为西地碘含片的使用注意事项（ ）。

- A、连续使用 7 天症状未见缓解应就医
- B、长期含服可导致舌苔染色，停药后可消退
- C、含服时可以嚼碎服用
- D、服用后应立即喝水

答案：B

209、关于消化性溃疡临床表现特点正确的是（ ）。

- A、病程短，不定时发作，节律性疼痛
- B、病程短，周期性发作，节律性疼痛
- C、病程长，不定时发作，节律性疼痛
- D、病程长，周期性发作，节律性疼痛

答案： D

210、服药期间舌苔及大便呈灰黑色，停药后自行消失的是（ ）。

- A、 雷尼替丁
- B、 奥美拉唑
- C、 硫糖铝
- D、 枸橼酸铋钾

答案： D

211、属于胃粘膜保护剂的是（ ）。

- A、 氢氧化铝
- B、 雷尼替丁
- C、 枸橼酸铋钾
- D、 奥美拉唑

答案： C

212、胃溃疡的节律性疼痛的特点是（ ）。

- A. 餐后 0.5 至 1 小时
- B. 餐后 2 至 4 小时
- C. 空腹痛
- D. 夜间痛

答案： A

213、对硫糖铝作用的描述，错误的是（ ）。

- A、 抑制胃蛋白酶和胆酸活性
- B、 促进胃黏液和碳酸氢盐分泌
- C、 抑制胃酸分泌
- D、 有利于黏膜再生和溃疡愈合

答案： C

214、消化性溃疡的四联疗法（ ）。

- A、 PPI+克拉霉素+阿莫西林+枸橼酸铋钾
- B、 PPI+克拉霉素+甲硝唑+铋剂
- C、 PPI+克拉霉素+枸橼酸铋钾+铋剂

D、埃索美拉唑+克拉霉素+甲硝唑+枸橼酸铋钾

答案：B

215、以下不符合消化性溃疡的是（ ）。

A、十二指肠溃疡好发于老年人

B、溃疡多位于胃和十二指肠球部

C、消化性溃疡发病率在我国南方高于北方

D、消化性溃疡的主要病因是幽门螺杆菌感染和非甾体抗炎药

答案：A

216、消化性溃疡并发症不正确的是（ ）。

A、出血

B、穿孔

C、幽门梗阻

D、食管溃疡

答案：D

217、下列哪项不是治疗消化性溃疡的药物（ ）。

A、枸橼酸铋钾

B、硫糖铝

C、洛哌丁胺

D、兰索拉唑

答案：C

218、以下关于消化性溃疡药物使用时不正确的是（ ）。

A、枸橼酸铋钾服药期间不得同时食用高蛋白饮食

B、甲硝唑不良反应以消化道反应最为常见，包括恶心、呕吐、食欲不振，头痛、眩晕等用药期间应戒酒，饮酒后可能出现腹痛、呕吐、头痛等症状

C、奥美拉唑肠溶片服用时不要嚼碎以免影响疗效

D、雷尼替丁对于原有肝脏疾患者剂量应减少，出现运动失调或其他中枢神经系统症状时应停药

答案：D

219、能较好地控制中度胃食管反流性疾病的症状或减轻和治愈食管炎的药是

()。

- A、质子泵抑制药
- B、H₂受体拮抗药
- C、促动力药
- D、解痉药

答案： B

220、下列哪个药不能与抗酸药同时服用 ()。

- A. 奥美拉唑
- B. 枸橼酸铋钾
- C. 甲硝唑
- D. 阿莫西林

答案:B

221、下列不是治疗消化性溃疡的常用药物有 ()。

- A、奥美拉唑
- B、硫糖铝
- C、枸橼酸铋钾
- D、阿司匹林

答案： D

222、慢性胃炎的症状不包括 ()。

- A、胃痛
- B、胃灼热
- C、反酸
- D、食欲变强

答案： D

223、关于微生态制剂,下列说法错误的是 ()。

- A、不能与抗菌药合用
- B、儿童禁用
- C、不得与抗酸药合用
- D、不得与活性炭等具有吸附性药物合用

答案：B

224、关于腹泻用药,下列说法错误的是()。

- A、溶血性贫血患者禁用盐酸小檗碱
- B、微生物制剂溶解时水温不得超过 40℃
- C、服用诺氟沙星应多饮水
- D、口服补液盐可直接服用

答案：D

225、慢性腹泻是指()。

- A、>1 个月
- B、>14 天
- C、>2 个月
- D、>3 个月

答案：C

226、下列药物不能治疗腹泻症状的是()。

- A、黄连素片
- B、硫酸镁
- C、双歧三联活菌
- D、蒙脱石散

答案：B

227、关于便秘的用药指导和患者教育,错误的是()。

- A、长期便秘者不宜长期使用刺激性泻药
- B、结肠痉挛所致的便秘,可选用膨胀性或润滑性泻药
- C、乳果糖适用于肝性脑病及长期卧床的老年患者
- D、同时服用牛奶,可增强比沙可啶的吸收
- E、排便反射减弱者禁用硫酸镁

答案：D

228、双歧三联活菌胶囊治疗腹泻的机制是()。

- A、防止蛋白质发酵
- B、补充正常的细菌

- C、减少腹胀和腹泻
- D、维持肠道正常菌群的平衡

答案：D

229、便秘常用药物是非处方药的是（ ）。

- A、乳果糖
- B、酚酞
- C、欧车前亲水胶
- D、莫沙必利

答案：A

230、治疗高血压危象，应首选（ ）。

- A、复方降压片
- B、心得安
- C、开博通
- D、硝普钠

答案：D

231、高血压合并心力衰竭不宜用下哪种药物（ ）。

- A、普萘洛尔
- B、卡托普利
- C、哌唑嗪
- D、氢氯噻嗪
- E、恩纳普利(依那普利)

答案：A

232、下列哪种药物与氯丙嗪合用可引起严重低血压（ ）。

- A、氢氯噻嗪
- B、哌唑嗪
- C、普萘洛尔
- D、氯丙嗪

答案：A

233、高血压合并消化性溃疡者不宜用（ ）。

- A、 甲基多巴
- B、 利血平
- C、 硝普钠
- D、 酚妥拉明

答案： B

234、伴有肾功能不全的高血压病人最好选用的降压药是（ ）。

- A、 氢氯噻嗪
- B、 利血平
- C、 α -甲基多巴
- D、 可乐定

答案： C

235、二级高血压的分级标准是（ ）。

- A、 收缩压为 130~139mmHg, 舒张压为 85~89 mmHg
- B、 收缩压为 140~149mmHg, 舒张压为 90~94 mmHg
- C、 收缩压为 140~159mmHg, 舒张压为 90~99 mmHg
- D、 收缩压为 160~179mmHg, 舒张压为 100~109 mmHg

答案： D

236、能抑制血管紧张素 I 转化酶的活性，减少血管紧张素 II 生成及醛固酮分泌，同时抑制缓激肽的降解，扩张血管，降低血压的药物（ ）。

- A、 美托洛尔
- B、 硝苯地平
- C、 缬沙坦
- D、 卡托普利

答案： D

237、下列药物中不是抗高血压药物的为（ ）。

- A、 利血平
- B、 洛伐他丁
- C、 可乐定
- D、 开博通

答案： B

238、利血平的降压机制是（ ）。

- A、 阻止囊泡对 NA 的再摄取
- B、 激动延脑孤束核抑制性神经元突触后膜的 α_2 受体
- C、 耗竭去甲肾上腺素能神经末梢递质
- D、 激动外周肾上腺素能神经元突触前膜 α_2 受体

答案： C

239、中枢性降压药是（ ）。

- A、 可乐定
- B、 利血平
- C、 拉贝洛尔
- D、 胍苯哒嗪

答案： A

240、不属于高血脂的表现是（ ）。

- A、 甘油三酯高
- B、 极低密度脂蛋白高
- C、 低密度脂蛋白高
- D、 高密度脂蛋白高

答案： D

241、用于高胆固醇血症首选药的是（ ）。

- A、 考来烯胺
- B、 吉非罗齐
- C、 阿昔莫司
- D、 洛伐他汀

答案： D

242、他汀类的不良反应不包括（ ）。

- A、 胃肠道反应
- B、 骨质疏松
- C、 横纹肌溶解症

D、肌痛

答案： B

243、患者男性，58岁。体检发现患IIa型高脂血症，以LDL升高为主，下列调血脂药宜首选（ ）。

A、洛伐他汀

B、考来替泊

C、普罗布考

D、吉非贝齐

答案： A

244、HMG-CoA还原酶抑制剂不能降低（ ）。

A、Ch

B、HDL

C、VLDL

D、TG

答案： B

245、洛伐他汀降血脂作用的特点主要是（ ）。

A、明显降低TG

B、明显降低HDL

C、轻度升高LDL-C

D、明显降低LDL-C、TC

答案： D

246、关于胰岛素及口服降血糖药的叙述，正确的是（ ）。

A、胰岛素仅用于胰岛功能完全丧失的患者

B、格列本脲作用的主要机制为刺激胰岛细胞释放胰岛素

C、双胍类主要降低患者的餐后血糖

D、双胍类药物对正常人血糖具有降低作用

答案： B

247、 α -葡萄糖苷酶抑制剂的特点，不正确的是（ ）。

A、口服吸收很少

- B、易导致低血糖
- C、临床用于各型糖尿病
- D、可单用于老年患者或餐后高血糖患者

答案：B

248、肥胖且单用饮食控制无效的糖尿病患者宜选用（ ）。

- A、吡格列酮
- B、格列本脲
- C、那格列奈
- D、苯乙双胍

答案：D

249、餐后血糖升高为主，伴餐前血糖轻度升高的2型糖尿病患者首选（ ）。

- A、二甲双胍
- B、吡格列酮
- C、阿卡波糖
- D、格列喹酮

答案：B

250、降血糖作用机制为抑制 α -葡萄糖苷酶的药物是（ ）。

- A、格列本脲
- B、二甲双胍
- C、那格列奈
- D、伏格列波糖

答案：D

251、低精锌胰岛素，精锌胰岛素，正规胰岛素分别为（ ）胰岛素。

- A、短效、中效、长效
- B、长效、中效、短效
- C、中效、长效、短效
- D、短效、长效、中效

答案：C

252、痛风发作期禁用（ ）。

- A、碳酸氢钠
- B、别嘌醇
- C、布洛芬
- D、萘普生

答案：B

253、下列不属于治疗痛风药物的是（ ）。

- A、秋水仙碱
- B、苯溴马隆
- C、别嘌醇
- D、骨化三醇

答案：D

254、关于别嘌醇的药理作用描述，错误的是（ ）。

- A、抑制黄嘌呤氧化酶，阻止次黄嘌呤和黄嘌呤代谢为尿酸
- B、防止尿酸形成结晶沉积
- C、抑制粒细胞浸润和白细胞趋化
- D、抗氧化，减少再灌注期自由基产生

答案：C

255、慢性痛风和痛风性肾病为抑制尿酸生成可选用（ ）。

- A、别嘌醇
- B、秋水仙碱
- C、泼尼松龙
- D、苯溴马隆

答案：A

256、在痛风治疗期间，下列哪个药不宜长期应用，可引起骨髓抑制，血尿、少尿、肾衰竭，胃肠道疾病等不良反应（ ）。

- A、别嘌醇
- B、丙磺舒
- C、阿司匹林
- D、秋水仙碱

答案： D

257、丙磺舒的作用机制是（ ）。

- A、抑制近端肾小管对尿酸盐的重吸收
- B、促进尿酸分解，将尿酸转化为尿囊素
- C、抑制粒细胞浸润和白细胞趋化
- D、防止尿酸形成结晶并沉积在关节及其他组织内

答案： A

258、秋水仙碱可导致下列哪种维生素可逆性的吸收不良（ ）。

- A、维生素 B₁
- B、维生素 B₁₂
- C、维生素 C
- D、维生素 B₆

答案： B

259、甲状腺素片过量时可引起（ ）。

- A、过敏和水肿
- B、肾衰竭
- C、甲状腺功能亢进
- D、粒细胞减少

答案： C

260、左甲状腺素钠长期大剂量使用的不良反应是（ ）。

- A、口干
- B、便秘
- C、甲状腺功能亢进
- D、多汗

答案： C

261、甲巯咪唑的少见严重的不良反应是（ ）。

- A、腹痛
- B、肾衰竭
- C、体重减轻

D、粒细胞减少

答案： D

262、甲亢术前准备正确的给药方法应是（ ）。

- A、碘化物和硫脲类同时给予
- B、先给硫脲类，术前两周再给碘化物
- C、先给硫脲类，术后两周再给碘化物
- D、只给放射性碘

答案： B

263、影响铁剂吸收的因素是（ ）。

- A、牛奶
- B、菠菜
- C、肉类
- D、茶叶

答案： D

264、下列不属于缺铁性贫血病因的是（ ）。

- A、铁的摄入不足
- B、骨髓造血功能不良
- C、慢性失血
- D、铁的需要量增加

答案： B

265、缺铁性贫血病人口服铁剂不正确的是（ ）。

- A、口服铁剂对胃肠道的刺激主要表现为恶心、腹痛、上腹部不适等
- B、饭后服
- C、服铁剂忌浓茶
- D、可与牛奶同服

答案： D

266、患者女，56岁。行胃大部切除术半年，伴头晕、乏力2个月，加重3天，进一步检查确诊为缺铁性贫血，发生贫血最可能的原因是（ ）。

- A、铁的需要量增加

- B、铁摄入不足
- C、铁吸收障碍
- D、肿瘤

答案： C

267、骨关节炎的主要病变是（ ）。

- A、 关节内化脓性感染
- B、 关节特异性炎症
- C、 关节软骨退变和继发性骨质增生
- D、 关节骨质疏松

答案： C

268、降钙素的特点，不正确的是（ ）。

- A、降低破骨细胞活性和数量
- B、抑制肾小管对钙、磷重吸收
- C、无中枢性镇痛效果
- D、主要不良反应有颜面潮红，注射部位红肿胀痛

答案： C

269、需要在肝脏中转化才能发挥作用的药物是（ ）。

- A、阿仑膦酸钠
- B、降钙素
- C、骨化三醇
- D、 α 骨化醇

答案： D

270、下列不属于治疗骨质疏松的药物是（ ）。

- A、碳酸钙
- B、泼尼松
- C、阿法骨化醇
- D、阿仑膦酸钠

答案： B

271、关于阿仑膦酸钠错误的说法是（ ）。

- A、因对骨矿化有良影响，本品应小剂量间歇性使用
- B、镁、铁制剂不会影响本药吸收
- C、与氨基苷类合用会诱发低钙血症
- D、须早晨空腹服药，服药后 1 小时不宜进食

答案：B

272、属 5 α 一还原酶抑制剂，可抑制前列腺生长的药品（ ）。

- A、黄酮哌酯
- B、氟他胺
- C、特拉唑嗪
- D、非那雄胺

答案：D

273、治疗细菌性阴道炎首选（ ）。

- A、甲硝唑
- B、青霉素
- C、红霉素
- D、克霉唑

答案：A

274、可用于治疗霉菌性阴道炎的药物有（ ）。

- A、氟康唑
- B、红霉素
- C、水杨酸乳膏
- D、异丙嗪

答案：A

275、荨麻疹的一线治疗药物有（ ）。

- A、阿伐斯汀
- B、异丙嗪
- C、苯海拉明
- D、酮替芬

答案：A

276、急性荨麻疹的药物选择（ ）。

- A、钙剂
- B、赛庚定
- C、氯苯那敏
- D、普鲁卡因

答案：C

277、下列哪个是治疗脂溢性皮炎的药物（ ）。

- A、复方硫磺洗剂
- B、水杨酸软膏
- C、硝酸咪康唑软膏
- D、苯海拉明

正确答案：A

278、湿疹的临床症状是（ ）。

- A、接触部位出现瘙痒和烧灼感,随后出现红斑,水肿等
- B、光照射部位出现潮红等
- C、皮损为略带黄色的轻度红斑,伴油腻性鳞屑等
- D、急性期表现为密集的粟粒大小丘疹等

答案：D

279、下列不用于治疗沙眼药物的有（ ）。

- A、氧氟沙星
- B、四环素
- C、米诺环素
- D、地塞米松

答案：D

280、对过敏性结膜炎等眼部炎症的对症治疗,可选用的眼用制剂（ ）。

- A、利福平眼药水
- B、地塞米松眼药水
- C、妥布霉素眼药水
- D、利巴韦林眼药水

答案： B

281、下列不属于口腔溃疡治疗药物为（ ）。

- A、糖皮质激素
- B、非甾体抗炎药
- C、抗微生物药物
- D、消毒防腐药

正确答案： B

282、口腔溃疡具有典型的周期性反复发作特点,有自限性一般病程为（ ）。

- A、一周
- B、5~10天
- C、7~10天
- D、10~12周

答案： C

283、适应症为用于牙龈炎、牙周炎、冠周炎及口腔溃疡的是（ ）。

- A、浓甲硝唑含漱液
- B、曲安奈德益康唑乳膏
- C、阿司匹林
- D、对乙酰氨基酚

正确答案： A

284、对药品养护时库房温湿度的记录要求是（ ）。

- A、 每天上午1次
- B、 每天下午两次
- C、 每天下午1次
- D、 每天上下午定时各1次

答案： D

285、药品重点养护每（ ）个月一次。

- A、 1
- B、 2
- C、 3

D、 4

答案： A

286、 在库药品检查通常采取月查季轮，每季度常采用的方法()。

A、 第一个月 30%，第二个月 40%，第三个月 30%

B、 第一个月 40%，第二个月 30%，第三个月 30%

C、 第一个月 40%，第二个月 40%，第三个月 20%

D、 第一个月 30%，第二个月 30%，第三个月 40%

答案： D

287、 药品养护的原则是()

A、 保证药品安全

B、 正确码放药品

C、 预防为主

D、 分类储存

答案： C

288、 冷库内制冷机组出风口()范围内不得码放药品。

A、 80cm

B、 100cm

C、 120cm

D、 140cm

答案： B

289、 《中国药典》中的“凉暗处”是指()。

A、 避光且不超过 20℃

B、 避光且不超过 25℃

C、 不超过 20℃

D、 2~10℃

答案： A

290、 根据 GSP 要求，储存药品库房内的相对湿度应为()。

A、 45%-75%

B、 35%-75%

C、 45%-65%

D、 35%-65%

答案： B

291、 药品养护组在日常养护检查中发现药品质量异常的，应悬挂“暂停发货”牌，其颜色为()。

A、 绿色

B、 黄色

C、 红色

D、 蓝色

答案： B

292、 以下不属于药品养护员岗位工作的是()

A、 对来货药品进行质量检查

B、 对在库药品进行质量检查

C、 指导保管员做好药品储存

D、 检查库房环境

答案： A

293、 一个 380 m²的冷库，需安装() 个温湿度监测测点。

A、 2

B、 3

C、 4

D、 5

答案： D

294、 仓库存有名贵中药饮片，保管员应采用()方式盘点。

A、 动碰货盘点

B、 对账式盘点

C、 地毯式盘点

D、 静态盘点

答案： A

295、 属于库存盘点范围的是()。

- A、 合格品库(区)
- B、 不合格品库(区)
- C、 退货库(区)
- D、 以上都是

答案：D

296、 耗时长、人工成本高的盘点方法是（ ）。

- A、 动碰式盘点
- B、 地毯式盘点
- C、 对账式盘点
- D、 日常盘点

答案：B

297、 企业周期性盘点常采用的盘点方法是（ ）

- A、 动碰货盘点
- B、 对账式盘点
- C、 地毯式盘点
- D、 静态盘点

答案：B

298、 当库房内湿度过低时,可采用的措施是（ ）。

- A、 通风
- B、 向地面直接洒水
- C、 湿拖布擦地
- D、 使用除湿机

答案：C

299、 下列符合主辅结合陈列原则的是（ ）。

- A、 高周转率带动低周转率药品销售
- B、 在不同季节把当季的药品陈列在醒目的位置
- C、 维生素类药品与矿物质类药品组合陈列
- D、 有效期近的药品摆放在货架前排

答案：A

300、 皮肤科内服药与皮肤科外用药相近陈列，运用的是（ ）。

- A、 易取易见原则
- B、 季节性陈列原则
- C、 主辅结合陈列原则
- D、 关联陈列原则

答案：D

301、根据《药品经营质量管理规范》，不符合药品零售企业药品的陈列要求的是（ ）。

- A、 按剂型、用途以及储存要求分类陈列
- B、 处方药、非处方药分区陈列
- C、 云南白药粉放置在外用药区域
- D、 地西洋片不得陈列

答案：C

302、 下列说法错误的是（ ）。

- A、 拆零药品应陈列于拆零专柜或专区
- B、 零售药店不得销售麻醉药品、精神药品
- C、 冷藏药品应陈列于冷藏柜中(2~10℃)
- D、 外用药与内服药应分开存放

答案：B

303、药店阴凉柜中的温度应保持在（ ）℃。

- A、 2~8
- B、 不超过 20
- C、 10~20
- D、 0~8

答案：B

304、拆零药品需保留（ ）。

- A、 原包装及说明书
- B、 原进货单
- C、 合格证明

D、 发票

答案： A

305、 药品销售的准备工作包括()。

A、 清洁空气、 调节温度

B、 打扫场地、 整理台面

C、 播放音乐、 调节灯光

D、 以上都是

答案： D

306、 一条商品线上包含的商品项目的数量,属于商品组合变化要素中的()。

A、 长度

B、 宽度

C、 深度

D、 关联度

答案： C

307、 依据市场需求强度及消费者感受来定价的方法,属于()。

A、 需求导向定价法

B、 成本导向定价法

C、 竞争导向定价法

D、 目标导向定价法

答案： A

308、 以下哪项不属于企业根据自身制定的零售定价目标、成本、需求以及不同的竞争环境采用的定价方法()。

A、 需求导向定价法

B、 成本导向定价法

C、 政府定价

D、 竞争导向定价法

答案： C

309、 拆零药袋上应标明()。

A、 药名

- B、 规格
- C、 用法用量
- D、 以上都是

答案：D

310、 每日 2 次的处方缩写为()。

- A、 qd.
- B、 bid.
- C、 qod.
- D、 qid.

答案：B

311、 对待顾客退换药品的要求时，应()。

- A、 顾客是上帝，应马上满足
- B、 药品绝不能退换
- C、 有礼接待，确认药品信息后按程序处理
- D、 见招拆招，以药店利益为主

答案：C

312、 接待退换药品的顾客处理程序是()。

- A、 倾听道歉—检查记录—征询处理—后处理—通报
- B、 倾听道歉—征询处理—检查记录—后处理—通报
- C、 检查记录—倾听道歉—征询处理—后处理—通报
- D、 检查记录—倾听道歉—征询处理—通报—后处理

答案：A

313、 以下情况可以为顾客办理退换药品的是()。

- A、 药品临近服用完，发现效果不佳
- B、 药品包装已损坏
- C、 现场拆封的滴眼剂发现絮状物
- D、 无法证实为本药店销售的药品

答案：C

314、 以下所列项目不属于药历中用药评价的是()。

- A、 用药问题与指导
- B、 药学干预内容
- C、 药物不良反应与解救措施
- D、 药物治疗建设性意见

答案： C

315、糖皮质激素一般在()给药。

- A、 上午 7~8 时
- B、 下午 2~3 时
- C、 晚上睡前
- D、 每日三餐后

答案： A

316、 以下所列项目中不属于药物治疗管理的核心要素的是()。

- A、 药物治疗评估
- B、 个人用药记录
- C、 药物监测数据
- D、 药物治疗行动计划

答案： C

317、 针对老年人用药咨询时，应当注意()。

- A、 语速宜加快，适当地多用文字、图片的形式
- B、 语速宜放慢，适当地多用文字、图片的形式
- C、 语速宜加快，适当地少用文字、图片的形式
- D、 语速宜放慢，适当地少用文字、图片的形式

答案： B

318、 以下所列项目中不是药历的格式和内容的是()。

- A、 患者病历
- B、 患者基本情况
- C、 患者用药记录
- D、 患者用药结果评价

答案： A

319、()是药师参与药物治疗和实施药学服务而为患者建立的用药档案。

- A、 病历
- B、 药历
- C、 台账
- D、 药典

答案：B

320、阿托伐他汀的最佳服用时间为()。

- A、 清晨
- B、 餐前
- C、 餐中
- D、 睡前

答案：D

321、下列药物服用时需要多饮水的是()。

- A、 抗利尿药
- B、 抗痛风药
- C、 止咳糖浆
- D、 舌下含片

答案：B

322、服用期间饮酒可引起双硫仑反应的药物是()。

- A、 甲硝唑
- B、 降血糖药
- C、 镇静药
- D、 抗组胺药

答案：A

323、下列关于服用舌下片的说法错误的是()。

- A、 迅速含于舌下 5 分钟左右
- B、 不能搅动、咀嚼、吞咽
- C、 保持安静少说话
- D、 服药后 20 分钟内不宜进食或饮水

答案：D

324、关于滴眼剂的使用说法错误的是（ ）。

- A、 清洁双手, 头后仰, 轻轻拉开下眼睑, 将药水滴入下眼睑内
- B、 瓶口不要接触眼睛
- C、 先滴病症重的后滴病症轻的
- D、 滴眼液打开超过 1 个月的不再使用

答案：C

325、关于用药方法说法正确的是（ ）。

- A、 发生漏服药品后, 切不可在下次服药时加倍剂量服用, 以免引起药物中毒。
- B、 茶碱能与四环素等药物发生螯合, 降低药效。
- C、 服用喹诺酮类应注意多晒太阳。
- D、 利尿降压药可在睡前服用。

答案：A

326、 调查人员将拟定的调查事项以面谈、电话或书面向被调查者提出询问, 以获得所需信息的方法, 属于（ ）。

- A、 询问法
- B、 观察法
- C、 实验法
- D、 网络调查法

答案：A

327、 调查人员直接或通过仪器在现场观察和记录调查对象的行为反应或感受的一种收集信息方法, 属于（ ）。

- A、 询问法
- B、 观察法
- C、 实验法
- D、 网络调查法

答案：B

328、 对于一类、二类新药, 可采用的市场价格策略为（ ）。

- A、 折扣、折让策略

- B、 中间定价策略
- C、 低价渗透策略
- D、 撇脂定价策略

答案：D

329、 主要应用于药品零售环节的市场价格策略为（ ）。

- A、 折扣、折让策略
- B、 中间定价策略
- C、 低价渗透策略
- D、 心理定价策略

答案：D

330、 通过多种媒体向社会宣传药品,以加强药品的生产者和经营者与用户之间的联系,从而达到销售药品、指导患者合理用药的目的。这种医药市场促销策略属于（ ）。

- A、 医药人员推销
- B、 医药产品广告
- C、 医药企业营业推广
- D、 医药公共关系促销策略

答案：B

331、 购买折让、免费货品、商品推广津贴、合作广告、推销金、经销商销售竞赛等属于针对（ ）的促销工具。

- A、 中间商
- B、 消费者
- C、 推销人员
- D、 产业用品

答案：A

332、 把本企业产品定位在与竞争者相似或相近的位置上,同竞争者争夺同一细分市场,属于（ ）。市场定位策略。

- A、 产品定位
- B、 使用者定位

- C、 迎头定位
- D、 市场缝隙定位

答案： C

333、 企业集中生产某一市场某一顾客群体所需要的各种产品。此种选择目标市场的模式为（ ）。

- A、 密集单一市场
- B、 产品专业化
- C、 选择专业化
- D、 市场专业化

答案： D

334、按年龄、性别、家庭规模、家庭生命周期、收入、职业等为基础细分市场是属（ ）。

- A、 地理细分
- B、 心理细分
- C、 人口统计细分
- D、 行为细分

答案： C

335、某药厂只生产抗微生物药,满足被微生物感染患者的需求。该目标市场模式为（ ）。

- A、 市场集中化
- B、 产品专业化
- C、 市场专业化
- D、 选择专业化

答案： B

336、不属于药品经营企业经济核算的内容有（ ）。

- A、 资金核算
- B、 利润核算
- C、 费用核算
- D、 税金

答案：D

337、药品销售额-进货成本-费用额-税金=（ ）。

- A、营业利润额
- B、经营利润率
- C、销售利润额
- D、资金利税额

答案：A

338、经营利润额+营业外收入-营业外支出=（ ）。

- A、销售额
- B、利润额
- C、利税率
- D、利润率

答案：B

339、顾客满意率是对企业服务态度、服务质量满意程度的评价。顾客满意率一般设满意、较满意和不满意三个等级，一般满意率为（ ）。

- A、85%
- B、75%
- C、90%
- D、60%

答案：A

340、药品资金利润率是指利润额与（ ）的百分比，它反映企业实现利润和上缴税金水平的综合指标。

- A、销售额
- B、税收额
- C、药品资金平均占用额
- D、利润率

答案：C

341、在收款时，营业员必须唱收唱付，其中“唱付”是指（ ）。

- A、让顾客知道药品的价格

- B、 收到货款后, 把金额大声说出来。
- C、 找钱时, 要把数目复述一次。
- D、 在将钱放进收款箱之前, 再数点一遍。

答案: C

342、 在收款时, 营业员必须唱收唱付, 其中“唱收”是指()。

- A、 让顾客知道药品的价格
- B、 收到货款后, 把金额大声说出来。
- C、 找钱时, 要把数目复述一次。
- D、 在将钱放进收款箱之前, 再数点一遍。

答案: B

343、 在接待顾客时的礼仪原则不包括()。

- A、 尊重
- B、 真诚
- C、 宽容
- D、 善良

答案: D

344、 顾客向营业员咨询药品的鉴别、 贮存和有效期, 属于()。

- A、 知识性咨询
- B、 质量查询
- C、 购销业务咨询
- D、 服务咨询

答案: A

345、 回答顾客的异议时, 药学人员把顾客提出的缺点转化成优点, 并作为他购买的理由。这种方法称作()。

- A、“是, 但是”法
- B、“自食其果”法
- C、“示范”法
- D、“直接否定”法

答案: B

346、当顾客向营业员咨询某药品对其疾病是否有效时，营业员可采用（ ）。

- A、“是，但是”法
- B、“自食其果”法
- C、“示范”法
- D、“介绍他人体会”法

答案：D

347、营业员接待顾客咨询的操作步骤不包括（ ）。

- A、 倾听顾客咨询和异议
- B、 证实你理解了顾客的问题
- C、 据理力争
- D、 努力成交

答案：C

348、 产生投诉的原因可从（ ）两个方面进行分析。

- A、 药店营业员以及顾客
- B、 药品价格以及质量
- C、 药店以及药品
- D、 顾客以及药品

答案：A

349、投诉处理的基本原则不包括（ ）。

- A、 树立正确的服务理念
- B、 选择恰当的时机
- C、 及时处理
- D、 分清责任

答案：B

350、下列关于处理顾客投诉技巧说法错误的是（ ）。

- A、 接待顾客的地点宜选择办公室、会议室等场所。
- B、 投诉应当由当事人接待顾客。
- C、 尊重顾客，站在顾客的立场来回应顾客的问题。
- D、 保存适当的有形证据。

答案：B

二、多项选择题（共 100 题）

1、医药职业道德的特点包括（ ）。

- A、全人类性
- B、连续性
- C、公平性
- D、严肃性
- E、法律性

答案：ABD

2、“文明经商，服务热情”，要求医药职业者（ ）。

- A、仪表整洁，举止大方
- B、微笑迎客、主动热情
- C、严肃认真，一丝不苟
- D、公平销售，讲究信誉
- E、尊重患者，平等待人

答案：ABDE

3、“遵纪守法，爱岗敬业”，要求医药职业者（ ）。

- A、仪表整洁，举止大方
- B、依法经营，遵守纪律
- C、严肃认真，一丝不苟
- D、爱岗敬业，尽职尽责
- E、按处方配药，谨慎出售

答案：BCDE

4、符合医药行业职业守则的是（ ）。

- A、遵纪守法，爱岗敬业
- B、质量为本，信誉第一
- C、急人所难，救死扶伤
- D、文明经商，服务热情
- E、团结协作，共同努力

答案：ABCDE

5、 职业道德与 () 等一起，构成了社会主义道德的整体。

- A、 社会公德
- B、 集体品德
- C、 家庭美德
- D、 环境道德
- E、 共产主义道德

答案：ACD

6、 下列哪些行为属于销售假药 ()。

- A、 某药店在 2019 年 9 月 15 日仍在销售包装标示有效期 2019、08、30 的某药品
- B、 某药店销售发霉的黄芪
- C、 某药品生产企业以血清替代疫苗销售
- D、 某药品批发企业销售的制白附子的水份含量不符合《中国药典》所载明的要求
- E、 某药品生产企业将某药品批号为 20200513 修改为 20200813 继续销售

答案：BC

7、 血液制品、()、药品类易制毒化学品不得委托生产；但是，国务院药品监督管理部门另有规定的除外。

- A. 麻醉药品
- B. 精神药品
- C. 医疗用毒性药品
- D. 生物制品
- E. 注射剂

答案：ABC

8、 下列需要分开摆放的是()。

- A、 药品与食品
- B、 药品与化妆品
- C、 药品和保健品

- D、 甲类非处方药和乙类非处方药
- E、 中药饮片与处方药

答案：ABCE

9、 企业质量管理部门负责人应当具备的条件是 ()。

- A、 执业药师资格
- B、 本科学历
- C、 3年以上质量管理工作经历
- D、 能独立解决质量问题
- E、 专科以上学历

答案：ACD

10、 可不开箱检查验收的药品有 ()。

- A、 外包装及封签完整的原料药
- B、 实施批签发管理的生物制品
- C、 有效期较长的药品
- D、 液体类药品
- E、 注射剂

答案：AB

11、 下列说法正确的是 ()。

- A、 不得将药品销售给证照不全的企业
- B、 不得夸大药品的功能
- C、 药品批发企业只能将药品销售给医药机构、药品零售药店
- D、 销售药品要有完备的手续
- E、 销售记录至少保存3年

答案：ABD

12、 下列药品中属于特殊管理的药品是 ()。

- A、 精神药品
- B、 放射性药品
- C、 戒毒药品
- D、 麻醉药品

E、 药品类易制毒化学品

答案： ABDE

13、 冷藏、冷冻药品经营企业需要配备哪些设施设备（ ）。

A、 冷库

B、 温湿度自动监测系统

C、 发电机

D、 冷藏车

E、 车载冷藏箱或保温箱

答案： ABCDE

14、 药品分别按处方药与非处方药分类管理的依据是（ ）。

A、 药品品种

B、 药品规格

C、 药品适应症

D、 药品剂量

E、 药品给药途径

答案： ABCDE

15、 根据《处方管理办法》经医生注明理由，处方用量可适应延长的情形包括（ ）。

A、 急性感染

B、 老年病

C、 行动不便患者的慢性病

D、 急性肠炎

E、 术后镇痛

答案： BC

16、 下列关于精神类药品管理的说法正确的是（ ）。

A、 凭专用处方销售

B、 片剂不得超过一日用量

C、 实行专人负责、专柜加锁、专用账册、专用处方、专册登记的“五专管理”

D、 缓控释制剂不得超过五天用量

E、 处方颜色为黄色

答案：AC

17、 关于药品商品名称的说法，错误的是()。

A、 药品商品名称的字体和颜色应当比通用名称更突出和显著

B、 药品商品名称不得与通用名称同行书写

C、 对于横版标签，必须在上二分之一范围内显著位置标出

D、 对于竖版标签，必须在右二分之一范围内显著位置标出

E、 药品标签和说明书中可以使用未注册的商标

答案：ACD

18、 关于药品说明书规定的说法，正确的是 ()。

A、 注射剂应列出主要辅料名称

B、 非处方药应列出全部辅料名称

C、 化学药列出全部活性成分

D、 中成药组方中应列出全部中药药味

E、 非处方药应列出主要辅料名称

答案：BCD

19、 下列药品中，在药品标签和说明书中需要印有特殊标识的有 ()。

A、 麻醉药品和精神药品

B、 外用药品和非处方药

C、 含特殊药品复方制剂和兴奋剂

D、 医疗用毒性药品和放射性药品

E、 生物制品

答案：ABD

20、 关于药品、医疗器械、保健食品和特殊医学用途配方食品广告，说法正确的是 ()。

A、 不得含有“热销、抢购、试用”、“家庭必备、免费治疗、免费赠送”等诱导性内容

B、 应当显著标明药品、医疗器械、保健食品和特殊医学用途配方食品的生产批准文号

- C、应当显著标明的内容，其字体和颜色必须清晰可见、易于辨认
- D、使用科研单位、学术机构、行业协会或者专家、学者、医师、药师、临床营养师、患者等的名义或者形象作推荐、证明。
- E、药品广告应当显著标明禁忌、不良反应

答案：ACE

21、《药品召回管理办法》中，说法正确的是（ ）。

- A. 药品召回分为主动召回和责令召回两种形式
- B. SFDA 主管全国药品召回管理工作
- C. 召回药品的生产企业所在地的省级 SFDA 负责药品召回的监督管理工作
- D. 药品召回，适用于药品制剂，不适用于原料药
- E. 药品召回仅适用于药品生产企业

答案：ABC

22、肾单位是肾结构和功能的基本单位，其组成包括（ ）。

- A、肾小体
- B、肾小管
- C、肾盂
- D、肾小盏
- E、肾大盏

答案：AB

23、心交感神经兴奋时可使（ ）。

- A、心率加快
- B、心收缩力增强
- C、心排血量增加
- D、血压升高
- E、血压降低

答案：ABCD

24、血糖参考值在正常范围的是（ ）。

- A、成人空腹血糖 4、9mmol/L
- B、成人空腹血糖 6、0mmol/L

- C、成人空腹血糖 6、9mmol/L
- D、餐后两小时血糖 6、7mmol/L
- E、儿童血糖 3、2mmol/

答案：ABD

25、免疫系统包括（ ）。

- A、免疫应答
- B、免疫器官
- C、免疫细胞
- D、免疫分子
- E、以上均是

答案：BCD

26、下列可能会导致血尿酸增高的是()。

- A、恶性贫血
- B、急慢性肾炎
- C、红细胞增多症
- D、甲状腺功能亢进症
- E、饮食影响

答案：BCD

27、下列关于血液循环的说法正确的是()。

- A、血液循环由体循环和肺循环组成
- B、体循环中的血液由左心室摄入主动脉，最后经上、下腔静脉流回右心房
- C、肺循环的特点是流程短
- D、经过肺循环后，血液由动脉血变成静脉血
- E、体循环的特点是流程短，经循环后由动脉血变成静脉血

答案：ABC

28、病毒感染后可导致机体出现明显的病理损伤和生理功能紊乱，下列属于细胞损伤的是()。

- A、细胞畸变
- B、细胞凋亡

- C、细胞免疫损伤
- D、杀细胞作用
- E、细胞免疫损伤

答案：ABD

29、 下列有关注射剂的叙述正确的是()。

- A、 注射剂均为澄明液体必须热压灭菌
- B、 适用于不宜口服的药物
- C、 适用于不能口服药物的患者
- D、 疗效确切可靠,起效迅速
- E、 可发挥局部定位的作用

答案：BCDE

30、 关于散剂特点的叙述正确的是()。

- A、 易分散,奏效快
- B、 制法简单
- C、 具有良好的防潮性
- D、 适宜小儿服用
- E、 携带方便

答案：ABDE

31、 关于胶囊剂特点的叙述正确的是()。

- A、 生物利用度较片剂高
- B、 可避免肝脏的首过效应
- C、 可提高药物的稳定性
- D、 可掩盖药物的不良臭味
- E、 可使胶囊具有各种颜色或印字,便于识别

答案：ACDE

32、 关于药典描述正确的是 ()。

- A、 药典、局颁标准均为国家药品标准
- B、 我国的药品标准分为国家标准和地方标准
- C、 药典是国家对药品质量规格及检验方法所作的技术规定

- D、药典由药典委员会负责制定和修订
- E、药品收载了我国所有药品的标准

答案：ACD

33、关于药品包装说法正确的是()。

- A、适合药品质量的要求
- B、方便储存，运输和医疗使用
- C、印有或贴有标签并附有说明书
- D、印有或贴有“安全”字样
- E、在国内销售的进口药品其标签上可以无中文表述

答案：ABC

34、药品不良反应中的“三致”反应指的是()。

- A、致畸
- B、致癌
- C、致突变
- D、致死
- E、致毒

答案：ABC

35、药物排泄的途径包括()。

- A、肾脏排泄
- B、胆汁排泄
- C、乳汁排泄
- D、汗腺排泄
- E、唾液排泄

答案：ABCDE

36、关于药物消除半衰期($t_{1/2}$)的说法正确的是()。

- A、消除半衰期(也称生物半衰期, $t_{1/2}$, 简称半衰期): 指血药浓度降低一半所需的时间
- B、药物的生物半衰期与药物本身的结构性质有关, 还与机体消除器官的功能有关

- C、 如果药物的生物半衰期有改变，表明消除器官的功能变化
- D、 肝、肾功能低下者，药物的生物半衰期缩短
- E、 消除快的药物半衰期长

答案：ABC

37、 影响药品吸收的因素包括（ ）。

- A、 药物的理化性质
- B、 药物的剂型
- C、 药物与血浆蛋白结合
- D、 吸收环境
- E、 药物规格

答案：ABD

38、 下列属于影响药物分布的因素是（ ）。

- A、 药物的剂型
- B、 药物的理化性质
- C、 药物与组织的亲和力
- D、 血脑屏障与胎盘屏障
- E、 体液 PH

答案：BCDE

38、属于四环素类药物的是()。

- A、 米诺环素
- B、 土霉素
- C、 金霉素
- D、 多西环素
- E、 阿莫西林

答案： ABCD

39、 下列具有抗铜绿假单胞菌作用的药物是（ ）。

- A、 磺胺嘧啶银
- B、 磺胺米隆
- C、 环丙沙星

D、妥布霉素

E、氧氟沙星

答案：ABCDE

40、抗菌药物的作用机制包括（ ）。

A、抑制细菌细胞壁的合成

B、产生灭活酶

C、改变细菌体内靶位结构

D、抑制菌体蛋白质合成

E、改变细菌代谢途径

答案：AD

41、下列药物中属于解热镇痛抗炎药的是（ ）

A、可待因

B、萘普生

C、布洛芬

D、对乙酰氨基酚

E、沙丁胺醇

答案：BCD

42、平喘 β 受体激动药有()。

A、沙丁胺醇

B、克仑特罗

C、特布他林

D、倍氯米松

E、氨茶碱

答案：ABC

43、对于抑制夜间基础胃酸分泌效果良好的抑酸剂是()。

A、雷尼替丁

B、法莫替丁

C、索美拉唑

D、泮托拉唑

E、 兰索拉唑

答案： AB

44、关于胃炎叙述正确的是（ ）。

- A、是由各种原因所致的胃粘膜炎症
- B、胃粘膜病变主要是充血、水肿、点状出血和轻度糜烂
- C、急性胃炎的主要表现是上消化道出血
- D、按临床发病的快慢，分为急性胃炎和慢性胃炎
- E、幽门螺杆菌引起的慢性胃炎一定要按疗程服用抗菌药物

答案： ABCDE

45、下列药物属于胃粘膜保护剂的是（ ）。

- A、枸橼酸铋钾
- B、阿莫西林
- C、胶体果胶铋
- D、酒石酸铋钾
- E、 氢氧化铝

答案： ACD

46、下列属于降压药物的是（ ）。

- A、ACEI
- B、血管紧张素 II 受体阻断药
- C、 β 受体阻断药
- D、H₂ 受体阻断剂
- E、白三烯受体阻断剂

答案： ABC

47、关于硝苯地平与普萘洛尔合用治疗高血压病的描述正确的是（ ）。

- A、 可用于伴有稳定型心绞痛的高血压患者
- B、 防止反射性心率加快
- C、 防止血浆肾素活性增高
- D、 防止反跳现象
- E、 合用时注意酌情减量，防止过度抑制心脏

答案：ABCE

48、属于抗高血压药物的有（ ）。

- A、利血平
- B、洛伐他丁
- C、可乐定
- D、开博通（卡托普利片）
- E、哌替啶

答案：ACD

49、下列哪些药物与普萘洛尔合用引起严重低血压（ ）。

- A、呋塞米
- B、氢氯噻嗪
- C、氯丙嗪
- D、哌唑嗪
- E、卡托普利

答案：CD

50、可抑制他汀类药物代谢，使不良反应发生率增加的药物有（ ）。

- A、红霉素
- B、酮康唑
- C、环孢素
- D、苯妥英钠
- E、利福平

答案：ABC

51、以下属于胰岛素不良反应的是（ ）。

- A、低血糖
- B、高钾血
- C、脂肪萎缩与肥厚
- D、胰岛素抵抗
- E、变态反应

答案：ACDE

52、关于 2 型糖尿病，错误的是()。

- A、起病急
- B、血浆胰岛素浓度显著降低
- C、较少发生酮症酸中毒
- D、多发生于青少年
- E、对胰岛素敏感

答案：ABDE

53、下列关于甲状腺激素的描述正确的是()。

- A、进中枢神经系统和长骨的发育
- B、正常量促进蛋白质合成增加，大剂量反而促进蛋白质分解
- C、影响心脏功能
- D、可用于治疗黏液性水肿
- E、缺少甲状腺素的呆小病人身材矮小、肢体粗短、智力正常

答案：ABCD

54、下列哪些药物对抗风湿效果较好()。

- A、阿司匹林
- B、氨基比林
- C、吲哚美辛
- D、双氯芬酸
- E、对乙酰氨基酚

答案：ABC

55、下列哪项不是阿司匹林小剂量抑制血小板聚集的原理是()。

- A、抑制 PGE1 生成
- B、抑制地诺前列酮生成
- C、抑制 TXA2 生成
- D、抑制依前列醇生成
- E、抑制花生四烯酸生成

答案：ABDE

56、下列属于肝素禁忌证的是()。

- A、消化性溃疡病
- B、严重高血压病
- C、脑出血
- D、亚急性心内膜炎
- E、肺栓塞

答案：ABCD

57、下列关于西替利嗪描述正确的是()。

- A、适用于皮肤过敏症：荨麻疹、湿疹、皮炎、药疹、皮肤瘙痒症、神经性皮炎、虫咬症、日光性皮炎
- B、对羟嗪过敏者禁用
- C、可用于过敏性鼻炎、血管舒缩性鼻炎、药物及食物过敏
- D、严重肾功能损害患者禁用，其他注意事项同酮替芬
- E、主要压力作用为收缩鼻黏膜血管

答案：ABCD

58、下列关于氯雷他定用药注意事项表述正确的是()。

- A. 孕妇、哺乳期妇女及对本药过敏者禁用。
- B. 12岁以下儿童、及肝肾功能不全者慎用。
- C. 本品性状发生改变时禁止使用。
- D. 儿童必须在成人监护下使用
- E. 保持室内清洁,避免再次接触过敏原,多服用 VitC 和 VitB 族

答案：ABCDE

59、用于缓解过敏性鼻炎的 H1 受体拮抗剂的是()。

- A. 开瑞坦
- B. 扑尔敏
- C. 麻黄碱
- D. 盐酸赛洛唑林
- E. 溴己新

答案：AB

60、治疗上感和流感用药的患者教育包括()。

- A、注意复方药品的禁忌症
- B、连续服用抗感冒药不得超过 10 天
- C、无严重症状者可不用药或少用药
- D、无并发细菌感染症状、体征和证据时不应连用抗生素
- E、感冒患者发热时应立即使用解热镇痛药

答案： ACD

61、抗感冒药的组方有（ ）。

- A、解热镇痛药
- B、鼻黏膜血管收缩药
- C、抗过敏药
- D、中枢兴奋药
- E、抗生素

答案： ABCD

62、支气管哮喘的治疗药物包括（ ）。

- A、糖皮质激素
- B、磷酸二酯酶抑制药
- C、抗胆碱药
- D、白三烯调节药
- E、过敏介质阻滞药

答案： ABCDE

63、对于呼吸道有大量痰液并阻塞呼吸道时，可选用哪种药物使痰液易于排出（ ）。

- A、氨溴索
- B、愈创木酚甘油醚
- C、乙酰半胱氨酸
- D、可待因
- E、羧甲司坦

答案： ABCE

64、下列药物可用于治疗过敏性鼻炎的是（ ）。

- A、扑尔敏
- B、氯雷他定
- C、色甘酸钠滴鼻剂
- D、西替利嗪
- E、炉甘石洗剂

答案： ABCD

65、治疗慢性咽炎的药物有（ ）。

- A、复方硼砂
- B、呋喃西林溶液
- C、复方草珊瑚
- D、溶酶菌
- E、扑尔敏

正确答案： ABCD

66、下列药物属于胃粘膜保护剂的是（ ）。

- A、枸橼酸铋钾
- B、阿莫西林
- C、胶体果胶铋
- D、酒石酸铋钾
- E、氢氧化铝

答案： ACD

67、下列哪些不是十二指肠溃疡的节律性疼痛的特点是()。

- A、餐后痛
- B、疼痛-进食-缓解
- C、服制酸剂后疼痛
- D、餐后,0、5至2小时疼痛
- E、疼痛不规则

答案： ACDE

68、关于胃炎叙述正确的是（ ）。

- A、是由各种原因所致的胃粘膜炎症

- B、胃粘膜病变主要是充血、水肿、点状出血和轻度糜烂
- C、急性胃炎的主要表现是上消化道出血
- D、按临床发病的快慢，分为急性胃炎和慢性胃炎
- E、幽门螺杆菌引起的慢性胃炎一定要按疗程服用抗菌药物

答案：ABCDE

69、对于抑制夜间基础胃酸分泌效果良好的抑酸剂是()。

- A、雷尼替丁
- B、法莫替丁
- C、索美拉唑
- D、泮托拉唑
- E、兰索拉唑

答案：AB

70、便秘的常见原因有()。

- A、进食量不足或食物过于精细
- B、饮水不足及小肠蠕动过缓
- C、长期滥用泻药、抗酸药以及胶体果胶铋
- D、生活不规律和不规律的排便习惯
- E、结肠低张力，肠运行不正常

正确答案：ABCDE

71、以下关于腹泻主要临床表现说法正确的是()。

- A、小肠病变的腹泻无里急后重，粪便不成形，可成液状，色较淡，量较多
- B、起病急，可伴发热、腹痛
- C、慢性胰腺炎和小肠吸收不良者，粪便中可见油滴，多泡沫，含食物残渣，有恶臭
- D、血吸虫病所致腹泻呈米泔水样
- E、缓泻药的使用疗程为不超过 15 天

答案：ABC

72、关于硝苯地平与普萘洛尔合用治疗高血压病的描述正确的是()。

- A、可用于伴有稳定型心绞痛的高血压患者

- B、防止反射性心率加快
- C、防止血浆肾素活性增高
- D、防止反跳现象
- E、合用时注意酌情减量，防止过度抑制心脏

答案：ABCE

73、下列属于降压药物的是（ ）。

- A、ACEI
- B、血管紧张素 II 受体阻断药
- C、 β 受体阻断药
- D、H₂ 受体阻断剂
- E、白三烯受体阻断剂

答案：ABC

74、下列哪项不是血管扩张药改善心脏功能的原因（ ）。

- A、增加冠脉血流量
- B、减轻心脏前后负荷
- C、降低外周阻力
- D、减少心输出量
- E、降低心肌耗氧量

正确答案：ACDE

75、能降血浆 TG 含量的药物是（ ）。

- A、考来烯胺
- B、烟酸
- C、非诺贝特
- D、洛伐他汀
- E、阿西莫司

答案：BCDE

76、考来替泊的降脂作用不包括（ ）。

- A、TC 下降
- B、HDL-C 下降

- C、LDL-C 下降
- D、TG 下降
- E、VLDL-C 下降

答案：BE

77、关于 2 型糖尿病，错误的是()。

- A、起病急
- B、血浆胰岛素浓度显著降低
- C、较少发生酮症酸中毒
- D、多发生于青少年
- E、对胰岛素敏感

答案：ABDE

78、可使血尿酸水平升高的药物有()。

- A、阿司匹林
- B、氢氯噻嗪
- C、青霉素
- D、胰岛素
- E、环孢素

答案：ABCDE

79、关于硫脲类抗甲状腺药，下列说法正确的是()。

- A、硫脲类是最常用的抗甲状腺药
- B、主要代表药物有甲硫氧嘧啶
- C、可用于甲状腺危象的辅助治疗
- D、可用于甲状腺手术的准备
- E、可用于甲亢的外科治疗

答案：ABCD

80、下列关于甲状腺激素的描述正确的是()。

- A、进中枢神经系统和长骨的发育
- B、正常量促进蛋白质合成增加，大剂量反而促进蛋白质分解
- C、影响心脏功能

- D、可用于治疗黏液性水肿
- E、缺少甲状腺素的呆小病人身材矮小、肢体粗短、智力正常

答案：ABCD

81、关于口服铁剂下列说法正确的是（ ）。

- A、口服铁剂首选二价铁
- B、维生素 C 课促进铁的吸收
- C、口服铁剂对胃肠道有刺激性，饭后服用可减轻
- D、对胃酸缺乏者，宜与稀盐酸并用，以利于铁的吸收
- E、铁剂治疗量不宜长期使用

答案：ABCDE

82、缺铁性贫血发病的常见因素是（ ）。

- A、食物加热、煮沸过度
- B、铁的吸收障碍
- C、铁损失过多
- D、需铁量增加而摄入不足
- E、月经过多

答案：BCDE

83、老年性骨质疏松的药物联合使用（ ）。

- A、二磷酸盐
- B、降钙素
- C、钙剂
- D、维生素 D
- E、雌激素

答案：ACD

84、妊娠期尿路感染可选用的抗菌药物有（ ）。

- A、利巴韦林
- B、阿莫西林
- C、链霉素
- D、呋喃妥因

E、头孢菌素类

答案：BDE

85、以下属于治疗荨麻疹的一线药物是（ ）。

A、西替利嗪

B、氯雷他定

C、赛庚啶

D、泼尼松

E、氯苯那敏

答案：AB

86、湿疹常用药品包括（ ）。

A、炉甘石洗剂

B、醋酸氟轻松软膏

C、西替利嗪

D、复方水杨酸酊

E、法莫替丁

答案：ABC

87、长期使用可引起味觉改变的是（ ）。

A、甲硝唑口腔黏贴片

B、浓甲硝唑含漱液

C、葡萄糖氯己定含漱液

D、西替利嗪

E、复方氨酚烷胺胶囊

答案：ABC

88、对细菌感染引起的结膜炎，可选用的药物有（ ）。

A、环孢素

B、红霉素

C、金霉素

D、氧氟沙星

E、醋酸可的松

答案：BCD

89.库房需要进行验证的设施设备包括()。

- A、冷库
- B、温湿度监测系统
- C、案秤
- D、用于冷链药品运输的保温箱
- E、温湿度计

答案：ABD

90.库房需要进行验证的设施设备包括()。

- A、冷库
- B、温湿度监测系统
- C、案秤
- D、用于冷链药品运输的保温箱
- E、温湿度计

答案：ABD

91、 药品仓库采用的降温措施包括 ()。

- A、 加冰
- B、 通风
- C、 遮光
- D、 安装保温层
- E、 空调

答案：ABCE

92、 以下关于特殊管理要求的药品在药品零售企业销售说法错误的是()。

- A、 复方甘草片和复方地芬诺酯片必须严格凭医师开具的处方销售
- B、 医疗用毒性药品和二类精神药品必须凭处方销售,并将处方保存 1 年备查
- C、 未成年人可购买第二类精神药品
- D、 销售含麻黄碱复方制剂类药品时,应当严格查验购买者身份证,并做好有关销售记录

E、含麻黄碱类复方制剂、复方甘草片和复方地芬诺酯片、含可待因复方口服溶液一次销售不得超过 2 个最小包装

答案：ABC

93、药品售后服务包括（ ）。

- A、 接待质量查询
- B、 处理退换药品
- C、 客户访问
- D、 用药交代与指导
- E、 药品不良反应报告

答案：ABCE

94、关于零售药店药品的管理正确的是()。

- A、 企业应当定期对陈列、存放的药品进行检查
- B、 重点检查拆零药品和易变质、近效期、摆放时间较长的药品以及中药饮片
- C、 发现有质量疑问的药品应当及时撤柜，停止销售，质量管理部门确认和处理，并保留相关记录
- D、 中药饮片装斗前应当符合，防止错斗、串斗，不必清斗
- E、 非药品专区与药品区域应有醒目的标志并进行隔离

答案：ABCE

95、关于儿童用药下列说法正确的是（ ）。

- A、 为了提高小儿用药的依从性,尽量选用颗粒剂、糖浆等口味适宜的儿童剂型。
- B、 婴幼儿皮肤角质层薄,药物很易透皮吸收,甚至中毒,切不可涂敷过多过厚。
- C、 如必须使用肠溶片(胶囊)、缓控释制剂等,应重点交代不可掰开或压碎服用。
- D、 儿童用药剂量可根据成人剂量进行简单缩减。
- E、 一般来说,能吃奶或耐受经鼻饲给药的婴幼儿,应尽量采用口服给药。

答案：ABCE

96、 关于用药咨询中应当关注的问题说法正确的是()。

- A、 特殊人群特殊对待
- B、 运用恰当的解释技巧
- C、 一视同仁地对待所有患者

- D、 及时回答，不拖延
- E、 尊重患者，保护患者隐私

答案：ABDE

97、 不宜用热水送服的药物是()。

- A、 助消化药
- B、 抗高血压药
- C、 含活菌制剂
- D、 活疫苗
- E、 利胆药

答案：ACD

98、 投诉处理的基本原则包括 ()。

- A、 树立正确的服务理念
- B、 选择恰当的时机
- C、 及时处理
- D、 分清责任
- E、 留档分析

答案：ACDE

99、 下列关于处理顾客投诉技巧说法正确的是 ()。

- A、 接待顾客的地点宜选择办公室、会议室等场所。
- B、 投诉应当由当事人接待顾客。
- C、 尊重顾客，站在顾客的立场来回应顾客的问题。
- D、 保存适当的有形证据。
- E、 事件比较复杂或顾客反映的问题比较严重,应由当事人的主管或同事接待。

答案：ACD

100、 一般顾客需要咨询的内容主要有()。

- A、 电话咨询
- B、 现场咨询
- C、 知识性咨询
- D、 质量查询

E、购销业务咨询

答案：CDE

三、判断题（共 50 题）

1、医疗单位之间可以转让、借用麻醉药品。（ ）

答案：错误

2、药品零售企业销售近效期药品应当向顾客告知有效期。（ ）

答案：正确

3、药品说明书中所含有的药品严重不良反应，不作为药品召回的依据。（ ）

答案：正确

4、药品批发企业可以将终止妊娠药品销售给门店。（ ）

答案：错误

5、可以使用未按照规定审评、审批的原料药、包装材料和容器生产药品。（ ）

答案：错误

6、未注明或者更改产品批号的药品属于假药。（ ）

答案：错误

7、对方剂未注明“生用”的毒性中药，应当付炮制品。（ ）

答案：正确

8、某日药品验收员有事请假，可由采购员来完成药品验收工作。（ ）

答案：错误

9、从事药品采购的人员应当具有高中以上文化程度。（ ）

答案：错误

10、药品零售企业可以不设仓库。（ ）

答案：正确

11、高密度脂蛋白增多易引起动脉硬化及高脂血症。（ ）

答案：错误

12. 正常人血小板计数的参考范围为 $100-300 \times 10^{12}/L$ 。（ ）

答案：错误

13、尿量和尿液 pH 的改变不会影响药物排泄。（ ）

答案：错误

14、根据药品的批号，可以追溯和身材该批药品的生产历史，能够判断该药品出厂时间的长短。()

答案：正确

15、缓释制剂是指药物能在设定的时间内自动以设定速度释放，使血药浓度长时间恒定地维持在有效浓度范围内的制剂。()

答案：错误

16、舌下给药具有吸收迅速和避开首过效应的特点。()

答案：正确

17、在盛装遇光易变质的药品时，应选用棕色容器。()

答案：正确

18、解热镇痛药均具有较强的抗关节炎作用。()

答案：错误

19、磷酸伯胺喹是用于控制复发和传播的抗疟药。()

答案：正确

20、硝苯地平有潮红、头痛、下肢水肿等不良反应。()

答案：正确

21、血压水平较高的老年重度高血压患者应迅速降压。()

答案：错误

22、苯巴比妥药物作用机理是激动 GABA 受体，抑制脑干网状结构上行激活系统而发挥疗。()。

答案：正确

23、多数解热镇痛药酸性较强，可致胃肠道反应。()

答案：正确

24、对乙酰氨基酸的商品名为扑热息痛。()

答案：正确

25、胶体果胶铋可以与牛奶同服。()

答案：错误

26、法莫替丁是属于抗酸药。()

答案：错误

27、 β 受体激动药有沙丁胺醇,沙美特罗,扎鲁司特等。()

答案: 错误

28、膨胀性泻药是药物在肠内吸收水分后膨胀形成胶体,使肠内容物变软,体积增大,反射性增加肠蠕动使粪便排出。()

答案: 正确

29、与普通感冒相比,流行性感冒主要症状表现为呼吸道症状轻,全身症状较重。()

答案: 正确

30、心绞痛比急性心梗疼痛更为严重,心绞痛病人常辗转不安。()

答案: 错误

31、使用盐酸羟甲唑啉滴鼻炎时,为了加强其疗效同时使用其他收缩血管类滴鼻剂。()

答案: 错误

32、长期的高血压会引起心、脑、肾等重要器官的结构和功能改变,严重的会引起这些器官的功能衰竭。()

答案: 正确

33、降压药硝苯地平片为血管紧张素转换酶抑制剂。()

答案: 错误

34、尿路感染的患者以女性较为多见。()

答案: 正确

35、十二指肠溃疡的上腹痛常表现为餐后发作。()

答案: 错误

36、抗高血压药物氯沙坦主要的不良反应是干咳。()

答案: 错误

37、某患者收缩压为150mmHg,舒张压为100mmHg,该患者为二级高血压。()

答案: 正确

38、慢性支气管炎的主要表现为咳嗽,咳痰,气喘及反复呼吸道感染。()

答案: 正确

39、糖尿病的典型临床表现是:多饮,多食,多尿,肥胖。()

答案： 错误

40、二甲双胍主要用于治疗 1 型糖尿病。()

答案： 错误

41、秋水仙碱用于急性期痛风性关节炎、短期预防痛风性关节炎急性发作。
()

答案： 正确

42、氢氯噻嗪与其他降压药合用可治疗中、重度高血压。()

答案： 正确

43、 药品堆码时无高度要求的堆垛一般不超过 2 米。()

答案： 正确

44、 销售包装内药品数量短少的属于不合格药品。()

答案： 正确

45、 药品经营企业在盘点时若实际库存小于账目库存，需做报溢处理。()

答案： 错误

46、 单位剂量麻黄碱类药物含量大于 30mg(含 30mg)的含麻黄碱类复方制剂，
必须凭处方销售。()。

答案： 正确

47、 经营企业负责药品不良反应报告的人员必须是专职人员。()

答案： 错误

48、直奔向所要购买的商品，并能讲出其产地、名称和规格，不买别的替代品的
顾客属于冲动型顾客。()

答案： 错误

49、 向顾客询问，得不到礼貌回答时，营业员可以说：“您好，如果您对我们的
服务工作感到不满的话，欢迎批评指正”。()

答案： 正确

50、 在接待顾客咨询过程中，只要顾客不断地提出问题和异议，就表明他们没有
购买药品的兴趣。()

答案： 错误

